


# LO PARVI

PUBLICATION DE L'ASSOCIATION NATURE NORD-ISERE



REVUE N° 7 - ANNEE 1997



**LO PARVI**  
**Publication de l'Association Nature Nord-Isère**  
**Maison Pour Tous**  
**38890 SAINT CHEF EN DAUPHINE**

**REVUE N° 7 - FEVRIER 1997**

◆◆◆ **SOMMAIRE** ◆◆◆

- |  |    |
|--|----|
| * Editorial<br>Bernard FRANÇON   | 3  |
| * Les chauve-souris de l'île Crémieu<br>Christophe GRANGIER  | 5  |
| * Campagne "arbres"<br>Maryse BUDIN, Jean-Jacques THOMAS-BILLOT  | 9  |
| * Première chronique ornithologique de l'île Crémieu<br>Cyrille DELIRY (coord.)<br>Christophe GRANGIER, Grégory BOURGUELAT | 22 |

## NATURE, QUAND TU NOUS TIENS...

Sur la fin de sa vie, Voltaire affirmait que le vrai bonheur consistait finalement à cultiver son jardin. Au même moment, Jean-Jacques Rousseau herborisait tout en se lamentant sur ses semblables.

Pourquoi évoquer ici ces deux écrivains du XVIII<sup>e</sup> siècle me direz-vous ? D'abord parce qu'ils ont vécu pas loin de chez nous (Voltaire à Ferney, Rousseau à Bourgoin lorsqu'il parcourait le massif du Pilat) mais surtout pour introduire l'éloge du contact avec la nature.

Fuite de la société des hommes ou recherche du bonheur, ce besoin de nature nous est encore plus indispensable à l'aube du XXI<sup>e</sup> siècle. Le grand débat entre la nature sauvage ou domestiquée s'avère plus que jamais d'actualité. Faut-il créer des parcs naturels pour se donner bonne conscience et bétonner par ailleurs ? J'ai même découvert l'expression de "béton végétal" pour caractériser certaines essences plantées dans certains lotissements. Le sauvage est-il beau ou faut-il le travail de l'homme pour l'aménager ?

Je pense qu'avant tout le vrai naturaliste n'a pas le désir de possession. L'herbier est un peu passé de mode et le temps où les entomologistes se montraient leurs tableaux de coléoptères épinglés, ce temps est révolu. Malheureusement certaines personnes sont encore atteintes de collectionnisme aigüe, nous n'en voulons pour preuve que ces florissants salons de vente ou d'échange d'insectes, de batraciens ou de reptiles. Ces personnes ne font pas partie de nos amis.

Il n'y a qu'à admirer la délicatesse des gestes de Cyrille saisissant un corps d'odonate ou les précautions de Christophe pour ne pas déranger l'habitat de la couleuvre pour comprendre la différence.

Au contraire de l'instinct de possession qui va mener le monde à sa perte, le naturaliste pense que les animaux et les végétaux sont le bien de tous et par là même il communique avec les règnes et espèces dits inférieurs, il s'identifie au Grand Tout et gagne en humanité.

Et puis, lorsque le naturaliste propose une intervention, ce n'est pas à fin de gestion de la nature mais plutôt pour aider certaines espèces qui sans cela seraient vouées à disparaître.

Jardiniers, écrivains, naturalistes et philosophes de tous les temps, unissons nos voix dans cette 7<sup>ème</sup> édition de la revue de LO PARVI.

Bernard FRANÇON



## LES CHAUVE-SOURIS DE L'ILE CREMIEU

Christophe GRANGIER

Dans le n°6 de la présente publication paru en 1996, j'ai rédigé un article se proposant de faire la synthèse sur 15 années de toutes les observations mammalogiques recueillies par l'Association Nature Nord-Isère "Lo Parvi" depuis 15 ans, dans la perspective de la parution prochaine d'un atlas des Mammifères de la région Rhône-Alpes.

Or, à la page 31, le paragraphe "**CHIROPTERES**" de cet article était bien succinct et comportait aussi quelques erreurs. Suite à des contacts avec Jean-François NOBLET et Raphaël QUESADA, tous deux bons connaisseurs de ces mammifères, il nous est désormais possible d'établir une synthèse correcte des espèces de Chiroptères présentes en Ile-Crémieu.

**Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*)** : présence connue aux grottes de La Balme en tant qu'estivant et hivernant et aussi sous la forme de cadavres ou de crânes. Deux mâles ont d'autre part été capturés au filet en juillet 1996 par J-F. NOBLET. Sur Creys-Mépieu, c'est un individu (peut-être un mâle mais il n'a pu être capturé) qui a probablement estivé dans un vieux bâtiment entre mai et juillet 1996 (Raphaël QUESADA & Jean-Jacques THOMAS-BILLOT). Cette espèce est classée comme menacée de disparition dans le "Guide des espèces animales menacées en Isère" (Conseil Général de l'Isère/Centre Ornithologique Rhône-Alpes 1995).

**Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*)** : signalée comme hivernante aux grottes de La Balme, cette espèce a également été observée dans la grotte de Malville sur Creys-Mépieu; un individu en hibernation est noté le 24/2/1996 par Raphaël QUESADA. Plusieurs anciens tas de guano incitent à l'hypothèse d'un ancien site de reproduction. La visite du site en été 1996 n'a rien donné. Ce rhinolophe est classé comme menacé de disparition en Isère (op. cit.)

**Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*)** : signalée comme hivernante aux grottes de La Balme, cette espèce est classée comme gravement menacée de disparition en Isère (op. cit.)

**Grand Murin (*Myotis myotis*)** : présence connue aux grottes de La Balme en tant qu'hivernant et aussi sous la forme de cadavres ou de crânes. Deux mâles y ont d'autre part été capturés au filet en juillet 1996. Il est possible que ce soit cette espèce (ou le Petit Murin?) que l'on trouve dans les gorges de la Fusa, Dizimieu, selon R. QUESADA (juvénile au plafond de la faille, cadavre dévoré au sol, parfois groupes plus importants). Le Grand Murin est classé comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Petit Murin (*Myotis blythi*)** : cité par erreur aux grottes de La Balme dans notre précédent article, mais cette espèce est signalée ailleurs en Ile Crémieu par TUPINIER et NOBLET. Il est possible que ce soit cette espèce (ou le Grand Murin?) que l'on trouve dans les gorges de la Fusa, Dizimieu, selon R. QUESADA (juvénile au plafond de la faille, cadavre dévoré au sol, parfois groupes plus importants). Il est classé comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Murin de Capaccini (*Myotis capaccinii*)** : espèce classée comme vulnérable en Isère (op. cit.) signalée comme estivante aux grottes de la Balme en avril 1957. Sa présence reste à confirmer sur le site.

**Murin de Daubenton (*Myotis daubentoni*)** : Deux femelles et un mâle capturés au filet sur la Save à Passins le 7/6/96 par R. QUESADA (in litt.).

**Murin à moustaches (*Myotis mystacinus*)** : signalé à Crémieu par J-F. NOBLET (in litt.) et sur la Save à Passins (un mâle capturé au filet le 7/6/96) par R. QUESADA (in litt.).

**Murin à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*)** : cité par erreur aux grottes de La Balme dans notre précédent article, il est présent selon J-F. NOBLET à Chamagnieu, Crémieu, Mépieu et Vernas. Un mâle adulte a été repéré récemment dans un vieux bâtiment sur Creys-Mépieu le 18/5/1996 par Raphaël QUESADA (in litt.).

**Murin de Bechstein (*Myotis bechsteini*)** : cité par erreur aux grottes de La Balme dans notre précédent article, il est par contre donné par TUPINIER à Crémieu en 1974. Plus récemment, un mâle adulte a été repéré dans un vieux bâtiment sur Creys-Mépieu le 18/5/1996 par Raphaël QUESADA (in litt.). Il est classé comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Sérotine commune (*Eptesicus serotinus*)** : connue aux grottes de La Balme sous la forme de cadavres ou de crânes jusqu'en juillet 1996 où 3 individus y ont été capturés au filet.

**Noctule commune (*Nyctalus noctula*)** : connue aux grottes de La Balme comme hivernante et sous la forme de cadavres ou de crânes jusqu'en juillet 1996 où 1 individu y a été capturé au filet.

**Noctule de Leisler (*Nyctalis leisleri*)** : signalée par Patrick BRUNET-LECOMTE.

**Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*)** : signalée autrefois aux grottes de La Balme sous la forme de cadavres ou de crânes. 4 individus, dont une femelle allaitante, capturés au filet en juillet 1996 prouvent sa reproduction.

**Pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*)** : signalée aux grottes de la Balme sous la forme de cadavres ou de crânes. Raphaël QUESADA a d'autre part découvert le 8/10/1995 un groupe de 8 individus derrière les volets d'une villa à La Gorge, Creys-Mépieu; 3 d'entre eux ont été capturés : il s'agissait de 2 femelles et d'un mâle aux gonades gonflées, ce qui fait penser à une possible reproduction. L'observation de groupes de cette taille est très rare. Cette espèce est classée comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Pipistrelle de Kuhl (*Pipistrellus kuhli*)** : Une trouvée morte par P. GIRAUD le 27 juillet 1995 aux grottes de la Balme, détermination confirmée par J-F. NOBLET. Cette chauve-souris y est reproductrice probable et on peut l'y observer aussi comme hivernante.

**Barbastelle (*Barbastella barbastellus*)** : Un juvénile a été trouvé en 1992 à la Gorge, Creys-Mépieu, par Raphaël QUESADA. Selon lui, Jean-François NOBLET estime certaine la reproduction de cette espèce sur le site. Elle est classée comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Oreillard commun (*Plecotus auritus*)** : connu comme hibernant aux grottes de la Balme.

**Oreillard méridional (*Plecotus austriacus*)** : cette espèce, inconnue jusqu'alors aux grottes de La Balme, a été révélée par la capture de 3 individus au filet en juillet 1996 par J-F. NOBLET.

**Minioptère de Schreibers (*Miniopterus schreibersi*)** : cette espèce s'est reproduite dans les grottes de La Balme et peut y être observée toute l'année. 6 individus y ont été capturés au filet en juillet 1996. On ignore si la reproduction se poursuit régulièrement sur ce site. L'espèce est classée comme vulnérable en Isère (op. cit.).

**Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*)** : très intéressante capture d'un individu de cette espèce méridionale dans les grottes de La Balme au filet en juillet 1996 par J-F. NOBLET. Elle est classée comme vulnérable en Isère (op. cit.).

Pour récapituler un peu tout cela, jusqu'à présent (novembre 1996), les espèces de chauve-souris présentes en Ile Crémieu sont :

**Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*)**  
**Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*)**  
**Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*)**  
**Grand Murin (*Myotis myotis*)**  
**Petit Murin (*Myotis blythi*)**  
**Murin de Capaccini (*Myotis capaccinii*)**  
**Murin de Daubenton (*Myotis daubentoni*)**  
**Murin à moustaches (*Myotis mystacinus*)**  
**Murin à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*)**  
**Murin de Bechstein (*Myotis bechsteini*)**  
**Sérotine commune (*Eptesicus serotinus*)**  
**Noctule commune (*Nyctalus noctula*)**  
**Noctule de Leisler (*Nyctalis leisleri*)**  
**Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*)**  
**Pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*)**  
**Pipistrelle de Kuhl (*Pipistrellus kuhli*)**  
**Barbastelle (*Barbastella barbastellus*)**  
**Oreillard commun (*Plecotus auritus*)**  
**Oreillard méridional (*Plecotus austriacus*)**  
**Minioptère de Schreibers (*Miniopterus schreibersi*)**  
**Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*)**

Soit 21 espèces dont 13 espèces (plus 1 à confirmer) connues jusqu'à présent aux grottes de La Balme, certainement le site "chiroptérologique" le plus prestigieux et le mieux étudié du Nord-Isère. .

Ce chiffre porte donc à **63** le nombre total d'espèces de mammifères dont la présence est confirmée en Ile Crémieu.

Toutefois, la faune des Chiroptères de l'Ile Crémieu est encore insuffisamment connue. Selon J-F. NOBLET, restent par exemple à résoudre le problème d'espèces jumelles telles que Grand et Petit Murins pour lesquelles la situation n'est pas claire et à rechercher les espèces non encore citées comme le Murin de Natterer ou la Pipistrelle de Savi. La découverte récente du Molosse de Cestoni à La Balme prouvent que de telles recherches peuvent encore payer.

Rappelons pour terminer qu'il existe une coordination nationale animée par la FRAPNA Isère qui traite tous les problèmes concernant les chauve-souris. En voici les coordonnées :

S.O.S. Chauve-Souris  
FRAPNA Isère  
5 Place Bir Hakeim  
38000 GRENOBLE  
Tél 04-76-42-64-08

Remerciements à Jean-François Noblet et à Raphaël Quesada pour les données, les conseils et la relecture.

Bibliographie :

- La faune vertébrée des grottes de La Balme, J-F. NOBLET, in "A la découverte des grottes de La Balme", D. ANDRES, 1997 (à paraître)

- Les chauve-souris des cavités du département de l'Isère, J-F. NOBLET, Spelunca n°27, 1987

- Guide des espèces animales menacées en Isère, Conseil Général de l'Isère/Centre Ornithologique Rhône-Alpes, 1995.

- Les Mammifères du Nord-Isère, synthèse de 15 années d'observation, C. GRANGIER, Lo Parvi n°6, 1996

## CAMPAGNE "ARBRES"

### INTRODUCTION

Depuis Adam et Eve dans le jardin d'Eden et même bien avant eux, les arbres peuplent notre planète.

Les plus anciennes civilisations, puis les suivantes, jusqu'à nos jours, les ont utilisés, dessinés, chantés, protégés, pillés, replantés, taillés, domestiqués, sculptés. Certains ont eu plus de gloire que d'autres tels les chênes sous lesquels Saint Louis rendait la justice, ou les tilleuls de Sully, ou les arbres choisis par les révolutionnaires pour symboliser la liberté, ou les pins des Landes, ou les buis bénis au temps de Pâques, etc...

Quel écolier n'a pas récité "le chêne et le roseau" ou "le petit bois de cornouillers" ou tant d'autres poèmes montrant l'attachement de tous à nos forêts.

Oui, nous aimons les arbres de notre pays, pays entre plaine et montagne et midi tout proche, "pays où le saule va à la rencontre de l'olivier, où le pèlerinage du peuplier reprend la marche du cyprès, où le noyer à peine éclaircit l'ombre du térébinthe, où le tilleul copie le mûrier" (P. Claudel).

Merci aux talentueux naturalistes de LO PARVI qui ont travaillé pour réaliser la clé ouvrant au grand public une meilleure connaissance des arbres et des arbustes de l'Isle Crémieu. Avec elle, dans 21 communes, des hommes et des femmes sont allés sur les chemins forestiers pour renseigner au mieux la fiche atlas élaborée pour cette campagne arbres 1996, dont voici la synthèse.

Scientifiques ou autres qui lirez ce travail, soyez indulgents ; outre les talentueux naturalistes cités plus haut, il y a aussi à LO PARVI des bénévoles qui essaient de s'investir sans connaissance très pointues et qui apportent modestement leur pierre à l'édifice.

Maryse BUDIN


Ensemble des données par commune - Tableau 1

Communes	Nombre total 89 répertoriées	Espèces communes 65 répertoriées	Espèces rares 15 répertoriées	Espèces très rares 9 répertoriées	Observateurs	Arbres remarquables
Aoste	24	24			Cyrille DELIRY	
Bâtie-Montgascon (La)	37	36	1		Pierrette CHRISTOLOME	Châtaignier
Chozeau	40	37	2	1	J. Loïc GIRANTON	
Courtenay	43	41	2		J.J. THOMAS-BILLOT	
Creys-Mépieu	39	34	5		Georges LACHAVANNE	
Hières sur Amby	47	42	4	1	Jean PIN	
Montcarra	27	26	1		Pierre GIRAUD	
Optevoz	45	43	2		J.J. THOMAS-BILLOT	
Parmillieu	28	27	1		J.J. THOMAS-BILLOT	
Ruy - Montceau	28	28			J.J. THOMAS-BILLOT	
Salagnon	33	33			J.J. THOMAS-BILLOT	
Siccieu St Julien et Carisieu	50	44	5	1	Christophe GRANGIER	
Soleymieu	40	39		1	J.J. THOMAS-BILLOT	
St Baudille de la Tour	43	39	4		Pierre GIRAUD	
St Chef	30	28	2		Marie-Rose CHEVALLET	If
St Romain de Jalionas	18	18			A. et G. FORTUNIER	
St Savin	32	32			J.J. THOMAS-BILLOT	
St Savin - Demptezieu	39	38	1		Ecole CE2-CM1-CM2	
St Sorlin de Morestel	38	35	3		Maryse BUDIN	Châtaignier
Vénérieu	35	33	2		Mr GAY	
Villette d'Anthon	56	54	2		Mr TUFFERY	Chêne pédonculé, Marronnier

N.B. : Certains observateurs n'ont pas spécifié la variété pour le saule, le peuplier, le chêne, l'érable ou l'aubépine. Ces espèces n'ont pas été comptabilisées.


## LO PARVI - CAMPAGNE ARBRES 1996

Nombre d'espèces recensées par commune



### Légende

Aost : Aoste  
 LaB : La Bâtie Montgascon  
 Cho : Chozéau  
 Cou : Courtenay  
 Mép : Mépieu  
 Hièr : Hières / Amby  
 Mon : Montcarra  
 Opt : Optevoz  
 Par : Parmilieu  
 Ruy : Ruy-Montceau  
 Sala : Salagnon  
 Sicc : Siccieu  
 Sole : Soleymieu  
 StB : St Baudille de la Tour  
 StC : St Chef  
 StR : St Romain de Jalionas  
 StS : St Savin  
 StS : Demptézieu (commune de St Savin)  
 StM : St Sorlin de Morestel  
 Vén : Vénérieu  
 Ville : Villette d'Anthon



CAMPAGNE "ARBRES" 1996

Fréquence des espèces - Tableau 2 - Espèces communes - 65 au total -

Fréquence	De 21 à 16 citations	De 15 à 11 citations	De 10 à 6 citations	Moins de 6 citations
<b>Espèces</b>				
les nombres indiqués entre parenthèses précisent le nombre total de citations dans les fiches pour chaque espèce (maximum 21)	aubépine monogyne (18) bouleau verruqueux (17) camérisier à balais (18) charme (19) chêne pédonculé (18) cornouiller sanguin (19) érable champêtre (18) frêne élevé (20) fusain (21) houx (18) merisier (17) noisetier (20) noyer (18) peuplier noir (16) prunellier (20) robinier faux acacia (19) saule marsault (18) sureau (21) troène (21) viorne mancienne (16)	aulne glutineux (15) buis (11) épine-vinette (11) érable plane (14) fragon petit houx (14) hêtre (11) nerprun purgatif (11) orme (14) tilleul à grandes feuilles (15) tremble (13)	aubépine épineux (9) bois de Ste Lucie (9) bourdaine (9) cerisier à grappes (7) châtaignier (9) chêne pubescent (6) chêne sessile (6) cornouiller mâle (10) érable sycomore (8) genévrier (10) groseiller rouge (6) hippocrépis arbrisseau (8) lilas (8) marronnier d'Inde (7) mûrier (8) peuplier blanc (8) peuplier d'Italie (10) pin sylvestre (10) platane (10) saule blanc (6) saule cendré (8) tilleul à petites feuilles (6) viorne à feuilles d'obier (9)	alisier blanc (5) peuplier grisard (4) poirier sauvage (4) pommier sauvage (4) prunier domestique (4) sapin blanc (2) saule à 3 étamines (1) saule des vanniers (4) saule drapé (1) saule fragile (4) saule pourpre (5) sorbier terminal (4)
<b>Nb d'espèces</b>	20	10	23	12
<b>Commentaires</b>	Espèces très répandues et faciles à reconnaître. Les 20 espèces qu'il faut savoir identifier !	Espèces caractéristiques (buis, fragon) et bien répandues. L'orme est à considérer au sens large (genre)	Espèces difficiles à déterminer et/ou peu répandues.	Présence de saules : identifications difficiles. Espèces forestières ou introduites (sapin)

## Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

### Cytise aubour, *Laburnum anagyroides*

6 citations; communes de Courtenay, Creys-Mépieu, Hières sur Amby, Optevoz, Saint Baudille de la Tour, Vénérieu.




### Néflier, *Mespilus germanica*

5 citations; communes de Chozeau, Saint Baudille de la Tour, Saint Sorlin de Morestel, Parmilieu, Villette d'Anthon.



### Sorbier des oiseleurs, *Sorbus aucuparia*

4 citations; communes de Courtenay, Chozeau, Optevoz, Villette d'Anthon.



### Saule à oreillettes, *Salix aurita*



4 citations; communes de La Batie-Montgascon, Montcarra, Saint Chef, Saint Sorlin de Morestel.



## Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

### **Epicea commun, *Picea abies***

4 citations; communes de Creys-Mépieu, Saint Chef, Demptézieu, Siccieu.



### **Ailante, *Ailanthus altissima***

3 citations; communes de Hières sur Amby, Saint Baudille de la Tour, Siccieu.




### **Erable de Montpellier, *Acer monspessulanum***

3 citations; communes de Creys-Mépieu, Hières sur Amby, Siccieu.



### **Groseillier des Alpes, *Ribes alpinum***

3 citations; communes de Creys-Mépieu, Hières sur Amby, Siccieu.




## Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

### Nerprun des rochers, *Rhamnus saxatilis*

2 citations.

Communes de Saint Baudille de la Tour, Siccieu.



### Erable à feuilles d'obier, *Acer opalus*

2 citations.

Communes de Choezeau et Siccieu.



### Cormier, *Sorbus domestica*

1 citation.

Commune de Saint Sorlin de Morestel.



### Groseillier à maquereaux, *Ribes uva-crispa*

1 citation.

Commune de Vénérieu.




## Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

### Mélèze d'Europe, *Larix decidua*

1 citation.


Commune de Creys-Mépieu.



### Baguenaudier, *Colutea arborescens*

1 citation.


Commune de Hières sur Amby.



### Sumac fustet, *Cotinus coggygria*

1 citation.

Commune de Soleymieu.



Pour mémoire, il reste à signaler les espèces qui n'ont fait l'objet d'aucune citation :

Aulne blanc, Bouleau pubescent, Saule faux daphné, Alisier de Fontainebleau, Amélanchier, Argousier, Chêne vert, Frêne oxyphille, Nerprun des Alpes.

9 espèces dans ce cas, dont la répartition dans notre territoire est tout à fait anecdotique.



## **CONCLUSION**

### **Conclusion relative à la quantité d'espèces et à leur identification**

Sur 89 espèces d'arbres apparaissant au départ dans la fiche de LO PARVI, 70 ont été citées (plus ou moins) ; 9 n'ont pas été vues par les observateurs de cette campagne :

- aulne blanc, bouleau pubescent, saule faux daphné, alisier de Fontainebleau, amélanchier, argousier, chêne vert, frêne oxyphylle, nerprun des Alpes.

Cet inventaire par commune est forcément incomplet, car :

- il a été parfois réalisé rapidement (quelques heures d'observation seulement pour plusieurs exemples)

- il est difficile de passer en revue toute la surface d'une commune (certains signalent n'avoir observé que quelques parcelles)

- selon la saison d'observation, il manque les bourgeons ou les fruits pour aider à l'identification

- on hésite parfois entre espèce sauvage ou espèce introduite

- les observateurs n'ont pas tous la même connaissance en botanique

Toutefois, ces derniers, chevronnés ou non, ont tenté de mettre à profit au mieux les indications contenues dans la clé de LO PARVI.

### **Conclusion relative à la répartition géographique des espèces**

On remarque que des espèces se retrouvent partout, quelque soit le sol (aubépine, fusain, cornouiller, noisetier...).

Par contre, d'autres espèces ne se plaisent que sur un sol déterminé : c'est le cas du châtaignier qui ne pousse que sur les sols cristallins, du cornouiller mâle qui a une préférence pour les sols calcaires.

Des espèces sont devenues rares, telles le mûrier car elles avaient été introduites dans un but utilitaire (soierie) et leur besoin a disparu.

### **Conclusions relatives à l'intérêt du public pour la connaissance des arbres**

On note l'intérêt manifeste de la part de tous (grand public, élus, enseignants) mais la plupart avoue leur ignorance (en moyenne, on connaît entre 10 et 20 espèces, y compris les cultivateurs).

Des espèces très répandues comme le fusain ou le cornouiller font partie du lot des méconnus.

Par contre, s'il y a un arbre remarquable dans la commune, les natifs du village en ont entendu parler et un grand nombre sait le situer et en parle avec attachement.

On note aussi la connaissance quasi générale d'arbres qui ont aidé des générations à survivre au temps des famines (châtaignier, noisetier, prunellier, noyer) ou à se soigner (sureau, aubépine, tilleul, genévrier...).

### **POUR LES FUTURES CAMPAGNES DE CE TYPE :**

☞ Il faudra simplifier encore, si possible.

☞ Plusieurs maires contactés accepteraient favorablement qu'un interlocuteur choisi parmi leur commission environnement ou même un non élu, participe à la campagne de LO PARVI ;  
le suivi serait ainsi facilité, l'association sachant qui contacter pour l'aider et le stimuler dans sa recherche.

☞ Les écoles sont intéressées, mais débordées par de multiples projets (une seule a répondu à l'enquête arbres), si elles mettent l'éducation à l'environnement dans leur programme, elles font presque toujours appel à un animateur.

Donc, si nous avons eu 21 fiches atlas complétées en 1996, une belle progression semble possible en 1997, puisque le secteur LO PARVI concerne environ 65 communes.

***ALORS RENDEZ-VOUS AU BORD DES RIVIERES  
POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE !***



	Aoste	Bâtie Montg	Courte nay	Creys Mépieu	Choz eau	Hières /Amby	Mont carra	Opte voz	St Bau dille	St Chef	St Rom Jallion	St Savin	Demp tezieu	St Sorlin Morestel	Sala gnon	Sic cieu	Soley mieu	Parmil lieu	Ruy Montc	Véné rieu	Vill Anth
Nerprun purgatif		X	X			X	X	X	X		X					X	X		X		X
Noisetier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Noyer commun	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Orme		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X				X	X
Peuplier blanc	X					X		X						X	X	X				X	X
Peuplier d'Italie	X		X	X	X		X							X		X				X	X
Peuplier grisard						X		X				X				X					
Peuplier noir	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Pin sylvestre			X		X	X	X	X					X		X				X		X
Platane		X			X				X	X		X	X						X		X
Poirier sauvage	X			X																X	X
Pommier sauvage	X																			X	X
Prunellier		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prunier domestique					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Robinier faux acacia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Sapin blanc													X							X	
Saule à 3 étamines								X													
Saule blanc		X					X	X				X					X				X
Saule cendré			X					X	X			X		X	X		X	X	X		
Saule des vanniers		X			X																X
Saule drapé																					
Saule fragile			X						X			X					X				
Saule marsault		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Saule pourpre			X					X	X								X				X
Sorbier torminal				X												X					X
Sureau noir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tilleul à grandes feuilles		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X
Tilleul à petites feuilles				X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X				X
Tremble			X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X				X
Troène	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Viorne à feuilles d'obier		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Viorne manceienne		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>54</b>

Aoste	Bâtie Montg	Courte nay	Creys Mèpieu	Choz eau	Hières /Amby	Mont carra	Opte voz	St Bau dille	St Chef	St Rom Jalion	St Savin	Demp tezieu	St Sorlin Morestel	Sala gnon	Sic cieu	Soley mieu	Parmill lieu	Ruy Montc rieu	Véné rieu	Vill Anth
<b>Espèces rares</b>																				
Ailante					X			X							X					
Auline blanc																				
Bouleau pubescent																				
Cormier													X							
Cytise aubour		X	X		X		X		X										X	
Epicéa			X									X			X					
Erable de Montpellier			X		X										X					
Groseillier à maquereau																				
Groseillier des Alpes			X		X										X					
Mélèze			X																	
Néflier				X				X					X				X			X
Nerprun des rochers																				
Saule à oreillettes	X						X	X	X				X							
Saule faux-daphné																				
Sorbier des oiseleurs		X		X																X
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Aoste	Bâtie Montg	Courte nay	Creys Mèpieu	Choz eau	Hières /Amby	Mont carra	Opte voz	St Bau dille	St Chef	St Rom Jalion	St Savin	Demp tezieu	St Sorlin Morestel	Sala gnon	Sic cieu	Soley mieu	Parmill lieu	Ruy Montc rieu	Véné rieu	Vill Anth
<b>Espèces très rares</b>																				
Alisier de Fontainebleau																				
Amélanchier																				
Argousier																				
Baguenaudier				X																
Chêne vert																				
Erable à feuilles d'obier				X											X					
Frêne oxyphylle																				
Nerprun des Alpes																X				
Sumac fustet				1	1										1	1				
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>1</b>										<b>1</b>	<b>1</b>				

## PREMIERE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE DE L'ISLE CREMIEU (1996)

Cyrille DELIRY (coord. Lo Parvi)  
Christophe GRANGIER & Grégory BOURGUELAT

Dans *l'Histoire et biologie des oiseaux de l'Isle Crémieu* (DELIRY, 1995) j'émettais le souhait "qu'à l'avenir nous nous donnions les moyens de réviser les connaissances sur cet acquis, qui se trouvent formulées par des hypothèses à renforcer sur le statut des espèces". Les caractéristiques de cette chronique est qu'elle est intemporelle, des données récentes comme des données anciennes peuvent y être intégrées. Elle tient compte tant des acquis par un résumé des connaissances publiées, que des nouveautés mises en profondeur par rapport à ces connaissances. L'adjectif crémolan, utilisé régulièrement dans le texte, s'appliquera à l'ensemble de l'Isle Crémieu. Il a été utilisé notamment pour sa sonorité agréable et pour des raisons pratiques de place.

Je tiens à remercier l'aide très active de Christophe Grangier et de Grégory Bourguelat dans la réalisation de ce document. Les courriers particulièrement pertinents, de Jean-François Noblet, Raphaël Quesada, Guy Verdin et Christophe Grangier, rédigés peu après la publication de *l'Histoire des oiseaux de l'Isle Crémieu* ont été particulièrement précieux pour la mise en route de cette chronique. Ils en ont été les premières bases. Merci pour leur contribution à l'ornithologie crémolane.

### **Compléments d'informations à *l'Histoire des oiseaux de l'Isle Crémieu* :**

#### **ERRATA**

- Une erreur orthographique récurrente sur le nom de R.Quesada ici corrigée. Avec mes excuses.
- L'orthographe correcte du nom du célèbre ornithologue Lavauden, m'a été signalée par J.F.Noblet.
- page 13 : carte de l'Isle Crémieu, corriger Frontenas par Frontonas.
- pages 25 & 69 : à mon grand regret, mais aussi à l'excitation de devoir le rencontrer sur le terrain, le Courlis corlieu, très rare dans la région, n'appartient pas à la liste des espèces crémolanes. En effet une erreur de saisie informatique a transmuté un non banal Courlis cendré en Corlieu.

#### **ADDENDA**

- page 16 : sur les remarques de R.Quesada, il faut ajouter le site du marais des Avenières, qui certes conserve un certain intérêt, mais a cependant été "détruit" aux 3/4.
- page 17 : aux milieux sablonneux significatifs, il est utile de rajouter le secteur de Vignieu et Vézeronce, notamment vers Ampro.

#### **PRECISIONS**

- Les sites Port Bigara et de la Vallée Bleue sont confondus. Il s'agit de la portion du Rhône aménagée entre Montalieu-Vercieu (38) et Serrières de Briord (01).

## REVISIONS

La liste rouge des oiseaux nicheurs de l'Isère a été révisée en 1995, suivant des critères internationaux dictés par l'UICN (version définitive, 1994) (LOOSE & DELIRY, 1995). Il semble utile de situer les espèces crémolanes par rapport à ce nouveau document. Ce texte ayant été rédigé postérieurement aux monographies de la présente chronique, il n'est pas étonnant d'y trouver des informations non encore disponibles dans le texte des espèces présentées dans cet article.

Cette nouvelle version considère **une seule espèce disparue** au cours d'une période récente de 10 à 20 ans : l'Outarde canepetière. Les dernières Outardes iséroises étaient signalées chez nous, au niveau de Satolas et Bonce.

**Des 16 espèces gravement menacées de disparition**, seulement le Faucon kobez, le Râle des genets et le Pipit rousseline ne concernent pas l'Isle Crémieu. Ce sont des espèces dont la régression a été très forte ou qui ne possèdent que des effectifs extrêmement faibles. Le premier est signalé nicheur sur la Plaine de Bièvre récemment. Il s'agit là d'un des premiers cas de nidification de l'espèce en France. Celle-ci entre dans une dynamique générale de progression de l'espèce et une régularité de sa présence depuis au moins 3 ans, en période de nidification dans la plaine de Bièvre (CORA-38, Bièvre). Nous avons eu en 1996, un témoignage de stationnement remarquable, tel que nous ne l'avions jamais vu chez nous à l'étang de Salette, ce qui cadre bien avec la dynamique en progrès du Faucon. Le Râle des genêts subsiste de manière relictuelle en Trièves (Drac Nature). Le Pipit rousseline est présent dans la vallée du Rhône en très faibles populations (GNVR). En ce qui nous concerne nous n'avons qu'une observation en période de migration.

Toutes les autres espèces sont présentes soit régulièrement, soit avec doutes quant à la reproduction dans l'Isle Crémieu. Pour beaucoup nous possédons l'essentiel des effectifs départementaux. C'est le cas de la Nette rousse, où les seuls couples isérois sont connus chez nous, le Vanneau huppé, dont nous recelons à peu près la moitié (une dizaine de couples) de la population relictuelle en Isère, la Marouette ponctuée, dont les seules données iséroises récentes en période de nidification concernent l'Isle Crémieu, le Pic cendré dont nous monopolisons les seuls cas connus en Isère. La Sarcelle d'hiver n'avait plus été notée en Isle Crémieu à bonne période depuis longtemps, cependant des données de 1996, donnent des espoirs de nidification à l'étang de Salette (C.Deliry, M.Bourbon). La Sarcelle d'été a niché récemment chez nous; un autre cas dans la région de Grenoble (CORA-38). Le Milan royal est donné nicheur possible en Isle Crémieu, mais plus vraisemblablement migrateur tardif avec vélocité de comportement reproducteur. Un seul couple est connu sur le département de manière certaine. La Bergeronnette printanière bien que très rare en Isle Crémieu a été nicheuse récemment. La Gorge Bleue à miroir est ici très mal connue et peut être mieux représentée qu'on ne le pense, notamment dans le secteur des Iles du Rhône (F.Micouloud) et de St Victor de Morestel; peu d'informations concrètes à son sujet. Le lieu de prédilection pour cet oiseau reste la tourbière de St Laurent du Pont, où il n'est cependant pas constaté dûment chaque année. Le Gobe Mouche noir est très rare sur le département et les cas de reproduction certifiée ne sont pas foules; des cas non concrétisés sont connus dans l'Isle Crémieu. Nous savons peu de chose sur les populations relictuelles de Pies-Grièches grises. Les observations se comptent sur les doigts de la main et encore la plupart concernent des hivernants. Les cas de reproduction possible de Pie-Grièche à tête rousse sont désormais anciens dans l'Isle Crémieu et n'ont pas été constatés récemment; l'espèce est très rare sur le département.

**14 espèces sont menacées de disparition.** La Chouette chevêchette est la seule qui ne réponde pas à l'appel dans l'Isle Crémieu, pour des raisons écologiques évidentes. Cette espèce montagnarde est spécialisée aux plateaux du Vercors, son secteur le plus régulier

(notamment plus fréquente sur le territoire de la Drôme) et peu notée, mais connue en Chartreuse...

Le Blongios nain, montre ses plus belles, mais faibles, populations dans l'Isle Crémieu, où l'espèce est non seulement stable, mais semble en progression lente. La seule colonie de Bihoreaux isérois se trouve dans notre district naturel *s.l.*, c'est sans compter les oiseaux du Haut-Rhône qui n'ont pas été considérés lors de la rédaction du livre rouge. En effet ceux-ci sont au sens strict dans le département de l'Ain. Les Hérons pourprés sont connus sur plusieurs sites et l'espèce n'est pas difficile à observer chez nous. La reproduction est certifiée récemment au moins sur l'étang de Salette, mais divers oiseaux sont notés par ailleurs, sans précision sur leur statut. Le Bas-Dauphiné abrite une population à peu près équivalente ou légèrement plus faible que la nôtre. Les Milouins se partagent entre le Bas-Dauphiné, les Chambarans et l'Isle Crémieu, avec dans chaque cas un très faible nombre de couples. Le Circaète Jean le Blanc est assez bien représenté dans le sud du département (quelques couples). Nous avons le bonheur d'abriter 1 à 3 couples nicheurs sur notre district naturel. Nos Courlis cendrés sont en mauvaise santé, peu de couples repérés avec une forte baisse des populations. C'est le cas un peu partout sur le département et on compte un grand nombre de sites où l'espèce a disparu. Les oiseaux sont encore assez stables dans un secteur entre Voiron et le Grand Lemps, mais ont disparu semble-t-il sur tous les sites connus entre les Avenières et Pont de Beauvoisin. Les nôtres font figure de rescapés. Nous partageons les faibles populations iséroises de Goéland leucophées, notamment avec le Trièves et la vallée du Rhône. Le Pigeon Colombin après une éclipse d'au moins une décennie a été recontacté dans l'Isle Crémieu sur au moins 3 sites où il est nicheur probable. L'espèce a grandement régressé dans le département et les sites sont rares. Le Hibou Petit Duc bien que discret s'est révélé de façon plus fréquente récemment, mais il est très difficile d'estimer la stabilité de nos populations qui ne concernent a priori pas plus de 2 à 4 couples. Connu en Chambarans et au sud du Grésivaudan par ailleurs. Le Torcol a fortement régressé, les données récentes sont moins dramatiques que nous l'imaginions dans l'Isle Crémieu, mais le statut de l'espèce reste très précaire. Ailleurs dans le département, l'oiseau peu localement être assez commun, mais là aussi il a subi une très importante régression. La Bouscarle de Cetti a disparu de l'Isle Crémieu, recontactée, deux fois récemment au confluent du Rhône et de l'Ain et au lac de la Save (C.Deliry), c'est tout. Ça a été le cas de l'essentiel du département, relictuelle, l'espèce ne subsistait plus que dans la basse vallée de l'Isère et la vallée du Rhône. Les informations récentes indiquent qu'elle recolonise petit à petit le territoire perdu. Elle reste cependant encore très rare. Les cas de nidification certifiée de Pouillots fitis sont rares dans le département. Nous en avons un récemment. Fréquente, voire localement très commune en migration, l'espèce ne reste pas sur les sites pour nicher.

**15 espèces sont vulnérables** dans le département. Nous ne possédons pas toutes les espèces réputées montagnardes comme l'Aigle royal (même si l'oiseau a paradé chez nous) et le Crave à bec rouge. Par contre toutes les autres sont représentées et nicheuses sur notre district. Le Grèbe castagneux, bien représenté, le Cygne tuberculé, de même, le Faucon Pèlerin, 3 couples au moins, l'Oedicnème criard, retrouvé sur certains sites, notamment de l'ouest et du sud-ouest du district, le Petit Gravelot, près de la moitié de l'estimation de la population iséroise, le Chevalier Guignette, un petit peu moins bien représenté, la Chouette chevêche, qui subsiste et semble stable localement, mais qui a disparu de divers secteurs favorables, le Martin-Pêcheur, lui aussi bien représenté, la Huppe fasciée, où nous comptabilisons un nombre significatif de données de nidification pour l'Isère, l'Hirondelle de rivage, avec vraisemblablement plus de la moitié des populations iséroises, les Locustelles tachetées et luscinioides, qui sont notées sur divers étangs et le Bruant proyer qui existe, localement dans la plupart des plaines agricoles, mais aussi sur le plateau, toujours en faible nombre.

D'autres espèces qui ne sont pas strictement menacées, mais sensibles, sont données dans le livre rouge. Ce sont le Busard cendré, que nous notons quant à nous de moins en moins, le Guêpier d'Europe, dont nous possédons une part significative de la population iséroise, le Héron cendré, découvert sur divers petits sites récemment, la Bondrée apivore, peu connue, mais présente tout de même, le Busard St Martin, présent, le Faucon hobereau, très bien représenté sur nos étangs, le Hibou Grand Duc, dont nous possédons avec 3 à 4 couples vraisemblablement, une part marginale des populations de l'Isère.

Les points forts dans l'Isle Crémieu se retrouvent dans les commentaires ci-dessus. Si dans divers cas (51% des espèces menacées du département) nous réunissons sur un territoire limité, une part notable voire la quasi totalité des populations iséroises d'une espèce menacée sur le département, ce n'est pas une généralité. Cependant, nous soulignerons les capacités d'accueil de notre territoire, avec une diversité de l'avifaune inégalée et ce ne sera qu'un argument de plus pour veiller à la préservation de l'environnement de notre district naturel.

### Plan des monographies d'espèces :

**NOM VERNACULAIRE**                      *Nom scientifique*                      **Statut**    *Statut isérois*

Résumé de la monographie publiée dans l'Histoire des oiseaux de l'Isle Crémieu (op. cit.)

Nouvelles connaissances acquises sur l'espèce, mises en profondeur des informations par rapport aux acquis et hypothèses posées. **En caractères gras les points clé du texte.**

#### Remarques :

- Les mois sont indiqués en chiffres romains, s'ils sont isolés dans le texte.
- Les dates correspondant à une phénologie sont données entre parenthèses. (10/4; 7/5-4/9; 22/9) signifie que l'espèce est observée généralement entre un 7 mai et un 4 septembre et qu'exceptionnellement nous avons eu affaire à des données plus précoces (10 avril) et plus tardives (22 septembre).
- Le statut général des espèces est donné suivant la liste rouge la plus large à laquelle elle appartient:

<b>LrE</b>	Liste rouge européenne	nicheurs	TUCKER et col., 1994
<b>LrEw</b>	Liste rouge européenne	hivernants	TUCKER et col., 1994
<b>LrF</b>	Liste rouge française	nicheurs	MAURIN, 1994
<b>LrD</b>	Liste rouge iséroise	nicheurs	DELIRY & LOOSE, 1995

- Le statut isérois des espèces est donné en complément (DELIRY & LOOSE, 1995), il est basé sur les catégories internationales de l'UICN (1994) :

<b>LR Disparu</b>	La disparition est jugée sur les 10 dernières années.
<b>LR En Grave Danger</b>	Gravement menacée de disparition, l'espèce présente une forte diminution de ses effectifs et/ou de sa répartition, et/ou est très localisée. Dans tous les cas son avenir à court terme est compromis.
<b>LR En Danger</b>	Menacée de disparition à moyen terme, l'espèce a un avenir moins compromis que précédemment.
<b>LR Vulnérable</b>	Espèce menacée qui témoigne d'un risque de disparition plus faible (long terme).
<b>LR Insuffisamment documenté</b>	Espèce vraisemblablement menacée sans qu'il soit possible de préciser dans quelle mesure. Elle doit correspondre à l'une des 3 catégories ci-dessus.
<b>Mesures de protect.</b>	Espèce présentant un faible risque de disparition, notamment en raison de mesures de protection ou d'activités humaines favorables à sa pérennité.
<b>Nicheur occasionnel</b>	La nidification de cette espèce n'a été constatée qu'un faible nombre de fois.
<b>Les autres espèces appartiennent à la catégorie Faible Risque, préoccupation mineure, ou ne nichent pas chez nous. Dans certains cas il s'agit aussi d'espèces disparues depuis longtemps.</b>	

### **Bibliographie complémentaire (\*) ou citée à nouveau :**

Voir DELIRY (1995) pour une bibliographie complète des oiseaux de l'Isle Crémieu.

BERTHET & col., 1976 ERRONE, voir CHABERT & col., 1976.

CHABERT B., NOBLET J.F., LEBRETON P., ARIAGNO D., HONORE S. & MAGNIN R., 1976 -- L'Avifaune de l'Isle Crémieu (Isère). -- Extrait d'*Evocation*, Bull. du groupe d'Etudes Hist. et Géo. du Bas Dauphiné, nouvelle série (19ème année), 1 : 4-19.

CORDONNIER P., 1972 -- Avifaune du Bas Bugey. -- *Bull.Soc.Nat.Arch.Ain*, 86 : 3-16.

\* DELIRY C., 1995 -- *Histoire et Biologie des oiseaux de l'Isle Crémieu*. -- éd. Lo Parvi, St Chef : 168 pp.

\* DELIRY C., 1995a-- Migration postnuptiale et oiseaux observés au confluent de l'Ain et du Rhône à partir d'Anthon (38-01). - Automne 1993. -- *Lo Parvi*, 5 : 31-49.

\* DELIRY C., 1995b -- Comptage des Guêpiers d'Europe (*Merops apiaster*) et des Hironnelles de rivage (*Riparia riparia*) dans l'Isle Crémieu (Isère) en 1994 : premières conclusions et résumé. -- *Lo Parvi*, 5 : 64-66.

\* DELIRY C., 1996 -- Observations ornithologiques de juin 1994 à décembre 1995 à l'étang de Salette, à partir de l'observatoire (Courtenay-38) -- *Lo Parvi*, 6 : 5-19.

\* DELIRY C. & LOOSE D. (coord), 1995 -- *Guide des espèces animales menacées en Isère*. -- CORA, Conseil Général de l'Isère : 21 pp.

\* DELIRY C. & LOOSE D. (coord), à paraître -- [titre non défini: sur quelques commentaires sur les espèces de Vertébrés menacés du département de l'Isère]. -- CORA, en préparation.

\* GIRAUD P., 1996 -- Ronde de nuit : les Rapaces nocturne en Isle Crémieu. -- *Lo Parvi*, 6 : 37-48.

GRANGIER C., 1993 -- Enquête Huppe fasciée (*Upupa epops*) - CORA 1993 -. Nos données pour le district naturel de l'Isle Crémieu. -- *Lo Parvi*, 4 : 25-28.

\* GRANGIER C., 1995 -- Faune des Z.N.I.E.F.F. -- *Lo Parvi*, 5 : 58-63.

LEBRETON P. (coord.), CORA, 1977 -- *Atlas ornithologique Rhône-Alpes*. -- CORA/DPN : 353 pp.

\* LO PARVI -- Observations remarquables publiées chaque mois dans la circulaire de l'association. L'ensemble de ces chroniques naturalistes ont été exploitées jusqu'en mars 1996.

\* MAURIN H. (coord.) et al., 1994 -- *Le Livre rouge. Inventaire de la faune menacée de France*. -- Nathan, WWF France, Paris : 176 pp.

THOMAS-BILLOT J.J., 1990 -- Le Grand Cormoran en Ile Crémieu : synthèse des observations de 1977 à 1990. -- *Lo Parvi*, 1 : 30-37.

THOMAS-BILLOT J.J., 1991 -- Avifaune d'un milieu typique de l'Isle Crémieu : l'Etang Neuf (Siccieu) et ses abords en période de nidification. -- *Lo Parvi*, 2 : 27-50.

\* TUCKER G.M. & HEATH M.F., 1994 -- *Birds in Europe : their conservation status*. -- Cambridge, GB : BirdLife international (BirdLife Conservation Series n°3) : 600 pp.

\* UICN, 1994 -- *Catégories de l'UICN pour les listes rouges*. -- UICN, Gand.

## PLONGEON ARCTIQUE

*Gavia arctica*

LrE

3 observations hivernales (XI et II) concernant dans 2 cas un stationnement de quelques jours (dans les années 80 au Lac de la Save, du 31/1 au 8/2/1987 à l'Isle d'Abeau et du 13 au 15/11/1986 au Lac Clair).

## GREBE CASTAGNEUX

*Tachybaptus ruficollis*

LrD

LR Vulnérable

Espèce sédentaire aux effectifs désormais renforcés en hiver, peu détectée en automne. Nicheuse assez commune dans les années 60 (plupart des étangs), stable depuis lors. Cependant en augmentation en hivernage depuis l'aménagement de la Vallée Bleue (record : 103 le 17/11/1988). 34 aux étangs de la Serre le 19/10/1986.

Des groupements record de 103, le 17/11/1988 à la Vallée Bleue, où il est assez fréquent de noter plus d'une trentaine d'oiseaux, et de 34 le 19/10/1986 aux étangs de la Serre étaient déjà connus. Le nombre de **20 oiseaux** sur le Rhône à Brangues le 8/1 et de **27** le 14/2/1996 (E. Bouillon, C. Deliry), nous semble être des groupes notables.

Notons une nichée de **5 poussins** observée en 1996 aux étangs de la Serre (G. Verdin).

## GREBE HUPPE

*Podiceps cristatus*

Espèce sédentaire, disséminée en nidification, plus localisée en hivernage (divers étangs désertés). Population estimée à une 50aine de couples dans les années 70. Sa progression est vraisemblable depuis le XIX<sup>e</sup> siècle.

Espèce à considérer **AC en été** (erreur in DELIRY, 1995), la population peut être estimée à une **cinquantaine de couples** comme dans les années 70 (BERTHET et col., 1976) sur les 75 à 100 que doivent concerner le département de l'Isère (DELIRY & LOOSE, à paraître).

L'espèce **couve dès début avril et premiers poussins signalés le 16/5**, aux étangs de la Serre en 1993 (G. Verdin).

Cette espèce très rare selon C. Grangier, dans le Val d'Amby y a été observée par lui-même, le 9 et 10/2/1996 à l'étang des Meules (St Baudille de la Tour).

## GREBE JOUGRIS

*Podiceps grisegena*

1 observation hivernale le 20/2/1979 au Lac Clair. Noté en outre à proximité du district crémolan le 28/3 de la même année à Romagnieu.

## GREBE ESCLAVON

*Podiceps auritus*

2 observations hivernales (II). 2 observations à proximité du district en 5/1978.

**3ème donnée crémolane** : 1 oiseau le 8/1/1996 aux carrières de Champdieu (C. Deliry, E. Bouillon).

**4ème donnée crémolane** : 1 du 8 au 10/3/1996 sur le Rhône à Brangues (G. Verdin). Notons qu'une "mini-invasion" est suspectée en France au cours de l'hiver 1995/96 (Ornithos, LPO, 1996).

## GREBE A COU NOIR

*Podiceps nigricollis*

Nicheur occasionnel

Espèce très peu notée aux passages alors qu'elle niche en Dombes. 1 le 11/4/1984 et 3 observations automnales entre VII (précoce) et XI, sur Ecorcheboeuf. Chanteur le 28/5/1967 à l'étang de Salette.

**Exceptionnel à cette époque du printemps** : 1 Grèbe à cou noir nuptial en juin 1993 aux étangs de la Serre (G. Verdin), **nicheur possible?** A une date plus classique, signalons 1 individu nuptial à l'étang de Salette le 17/3/1996 (C. Deliry).

Outre 3 observations sans précisions **en automne**, situées à Ecorcheboeuf, nous ajouterons 1 oiseau le **16/10/1994** aux étangs de la Serre (K. Funkiewiez, E. de Thiersan, M.P. Schabert, C. Deliry).



- Parade de Grèbes à cou noir -

## GRAND CORMORAN

*Phalacrocorax carbo*

Espèce notée aux deux passages (10/9; XI-I?) (III-IV, désormais exceptionnellement en V) et en hivernage. Espèce en progression avec changement de la phénologie. Hormis une donnée sur Bourgoin vers le début du siècle, première donnée le 18/3/1977. Depuis l'espèce est en augmentation, avec une précocité des mouvements d'automne, l'hivernage clairement régulier depuis 1986 et présence d'un dortoir sur la Vallée Bleue dès 1988 (record : 845 le 15/1/1991) et un ou deux sur les Iles du Rhône, récemment (record : environ 400). 105 aux étangs de la Serre le 15/2/1992. Un article de THOMAS-BILLOT (1990) réalise une synthèse des observations de 1977 à 1990.

**Nombre important sur les étangs de la Serre** le 25/1/1994 où ils sont 90 (G.Verdin); notons que le record sur ce site est de 105 le 15/2/1992.

C.Grangier (*in litt.* du 4/8/1995) souligne l'**éclatement du dortoir de la Vallée Bleue** ces dernières années, ce qui compromet les chances d'égaliser le record de 845 oiseaux du 15/1/1991 (DELIRY, 1995), en effet les derniers comptages sur le site ne révèlent **guère plus de 100 oiseaux** ces 3 dernières années (1994-96) : les observations réalisées en 1994, révèlent une baisse sensible des effectifs de l'espèce par rapport aux années précédentes (Lo Parvi) et par exemple sur le dortoir de la Vallée Bleue, seulement 95 et les Iles du Rhône, 192, lors du comptage du 15/1/1995 (J.J.Thomas-Billot, C.Grangier, C.Deliry), 507 oiseaux sont comptés le 20/1/1996 à la Vallée Bleue (J.J.Thomas-Billot, C.Grangier) alors que **le dortoir des Iles du Rhône est effarouché par des coups de fusils** : 80 oiseaux tentent désespérément de s'installer pour dormir et s'envolent sans cesse (K.Funkiewicz, C.Deliry, J.P.Drevon). Cependant la situation peut être ponctuellement meilleure au printemps avec 163 oiseaux à l'île des Noyers le 15/3/1996, ils sont encore 86 le 4/4 de la même année, 35 le 7/4 (C.Deliry).

**Quelques individus portant des bagues de couleur**, *a priori* d'origine danoise, ont été notés en 1995 aux étangs de la Serre et de Salette (Lo Parvi).

Par ailleurs **l'espèce s'est montrée pour la première fois en période estivale**, avec 1 immature le 7/6/1995 aux Iles du Rhône (G.Verdin). Statut rare à reporter pour l'été. 1 immature passera l'été 1995 à Brangues (G.Verdin), noté le 27/7 par J.P.Drevon. Le stationnement estival sera vraisemblablement plus fréquent désormais; il semble en effet que des oiseaux aient construit **2 nids** entre fin mars et début avril en 1996 sur l'île des Noyers (C.Deliry). Sur les Iles du Rhône, **le retour est d'ailleurs précoce**, avec 2 oiseaux le 15/9 (C.Deliry). Nous voyons donc que, outre ce cas d'estivage marginal, l'arrivée de plus en plus précoce en automne se confirme, précédente date précoce : 29/9, avec un passage signalé par ailleurs de 22 individus sur Anthon le 10/9/1993.

## GRAND BUTOR

*Botaurus stellaris*

LrE LR En Grave Danger

Il s'agit d'un hivernant ponctuel noté sur les étangs de la Rama et de Salette. Irrégulier, il a été noté en période de nidification de 1978 à 1984 (IV-VI) et sur la marais de l'Ambossu les 6/4/1981 et 30/5/1984. 2 données automnales en VII et VIII.

Des informations qui méritent d'être précisées signalent qu'il **nicherait** (ou aurait niché) à **l'étang de Salette** (J.F.Noblet, *in litt.*).

Un oiseau a été **tué dans les années 30** - et naturalisé - vers Lancin (étang de Caraman -loc.non retrouvée sur carte-)(Berthet père, *in litt.* d'E.Berthet du 6/12/1976 adressée à J.F.Noblet).

**1 en période hivernale et tardif**, aux étangs de la Serre, les 13/2 et 6/3/1996 (G.Verdin).

## BLONGIOS NAIN

*Ixobrychus minutus*

LrE LR En Danger

Espèce migratrice et nidificatrice peu commune (10/4; 7/5-4/9). Divers sites sont donnés dans les années 70, certains semblent occupés encore aujourd'hui, mais la nidification est mal suivie. L'espèce est considérée comme moins commune qu'en Dombes ou dans le Forez.

Il faut ajouter aux sites de nidification celui de **l'étang de St Bonnet** où l'espèce a niché et niche peut-être encore (selon C.Grangier qui signale une observation d'un mâle le 8/7/1981 dans la roselière), **l'étang de Lempis** où l'espèce a été notée en période de nidification, chanteur le 8/5/1995 (R.Quesada), observé en juin 1995 (R.Quesada, J.F.Noblet, C.Deliry, D.Loose), ainsi que **l'étang de Salette** où l'espèce a été observée par J.J.Thomas-Billot en juin 1995.

**Premier mâle le 13/5/1994** aux étangs de la Serre (G.Verdin).

**Sur ce site il est possible de suivre l'espèce de 1992 à 1995** à partir des données de G.Verdin, avec nidification plus que probable : peut-être **jusqu'à 3 sites de nidification** en 1992, 2 en 1993 et 1994 et 1 observation -sans suivi- d'une femelle en 1995.

## BIHOREAU GRIS

*Nycticorax nycticorax*

LrE LR En Danger

Espèce migratrice et rare nidificatrice (8/4-VIII; 2/9). 5 couples signalés sur les Iles du Rhône dans les années 70 et 5 nids le 29/4/1989, nicheur constaté en outre en 1991, présent jusqu'à Brangues en période de reproduction. Notons à même période 15 observations vespérales de 1979 à 1981 (15/6-21/8). En fin d'été des immatures erratiques se dispersent.  
\*Econcheboeuf

1 Bihoreau observé à la Paluette sur Aoste le 11/9/1995 (G.Verdin, C.Deliry), constitue désormais notre **donnée la plus tardive** (date précédemment donnée : 2/9/1976).

## CRABIER CHEVELU

*Ardeola ralloides*

LrE

Espèce notée 5 fois lors du passage printanier (dates classiques en Rhône-Alpes, 27/4-30/5) de 1972 à 1989.

## HERON GARDEBOEUF

*Bubulcus ibis*

3 observations hivernales, le 22/1/1984 à Montcarra, 2 depuis une 15aine de jours le 22/1/1992 aux Avenières et en 1993 sur St Baudille.

**4ème donnée crémolane** avec 2 individus suivis en vol de Carizieu au village de Siccieu, le 4/10/1994 (C.Deliry). C'est une **première automnale**, les trois autres données étant signalées pour le mois de janvier. Donc espèce à considérer comme **rare en automne**.

**5ème donnée**, stationnement d'un individu, fin décembre 1995 sur Arcisse à St Chef (B.Françon).  
6ème citation : il s'agit du stationnement d'un individu autour du haras de la Paluette et au sud du village de St Didier d'Aoste, noté quasi quotidiennement du 23/12/1995 à fin janvier 1996 (C.Deliry, P.Giraud, D.Loose, S.Stéfaniak, E.Bouillon, G.Verdin).

## AIGRETTE GARZETTE

*Egretta garzetta*

Espèce migratrice et rare nidificatrice (13/4-14/10). 2 couples nicheurs sur les Iles du Rhône (1977), lieu où la nidification a été confirmée assez récemment. Sporadique en migration ou erratisme sur les étangs.

La **première Aigrette garzette annuelle**, signalée le 13/4/1993, avait été observée par G.Verdin aux étangs de la Serre. Record de précocité battu avec 5 individus sur ce même site le **31/3/1994** (G.Verdin). Pour d'autres dates plus classiques, notons 1 Garzette le 8/5/1995 sur Creys-Mépieu (R.Quesada), ainsi qu'un 1 individu le 6/5/1995 à l'étang de Salette (G.Verdin, K.Funkiewiez et C.Deliry).

**Non loin de la colonie d'Ardéidés du Rhône**, l'espèce a été notée sur le confluent du Guiers et du Rhône, 1 le 24/7 et 1 le 31/8/1995 (C.Deliry).

## GRANDE AIGRETTE

*Egretta alba*

2 données le 23/9/1977, en période migratoire marginale en Rhône-Alpes et en hiver (1/1994), en rapport avec un hivernage récent dans la région, notamment en Dombes.

Nos recherches permettent de préciser que le premier cas d'observation de Grande Aigrette faite par A.Baras le 23/9/1977, a été obtenu à l'embouchure du Guiers (Aoste) en compagnie de J.F.Noblet.

Des **précisions sur sa présence en janvier 1994 aux étangs de la Serre** : 1 oiseau observé les 25 et 30/1, 2 le 31/1, 1 du 11 au 18/2 (G.Verdin); la répétition de telles observations est une première dans l'Isle Crémieu. Ceci reprendra l'année suivante avec 1 individu sur Brangues le 2/1 (J.P.Drevon), 3 le 21/1 sur **les Iles du Rhône** (C.Grangier, C.Deliry; record numérique), encore 3 le 30/1, sur le même lieu (F.Micouloud), 1 autre le 6/2 (C.Deliry) et **encore 2 franchement tardives le 9/3** (C.Deliry) (nouveau record tardif, le précédent étant celui du 18/2/1994); mais aussi sur Brangues, 1 le 26/2 et 2 sur l'étang de Chêne d'après F.Micouloud.

A la donnée du 23/9/1977 et aux informations alors imprécises de janvier 1994 (DELIRY, 1995), **nous sommes désormais en mesure de considérer au moins 11 nouveaux cas** répartis sur les années 1994 et 1995, ce qui témoigne de toute évidence d'une **augmentation des effectifs** de l'espèce en hiver dans notre secteur (à passer du statut rare à peu commun). Ce phénomène constaté de la même manière avec un temps d'avance dans la région Rhône-Alpes (Dombes, notamment) se généralise. Les observations ont été réalisées chez nous **entre le 2/1 et le 9/3** en 1995.

Cependant **pour poursuivre la "saga" de la Grande Aigrette dans l'Isle Crémieu**, il va nous falloir ajouter les observations menées à partir de l'automne 1995 : avec 1 premier individu le 17/9 aux étangs de la Serre (G.Verdin) (celle-ci est conforme à l'unique autre observation automnale connue jusqu'alors, le 23/9/1977). Ensuite 1 les 23/10 (F.Micouloud) et 17/11 (C.Deliry), sur les Iles du Haut-Rhône, avec les Cormorans. **L'amorce d'un passage ou erratisme postnuptial, se fait-il sentir?** Une arrivée plus précoce? Pour continuer avec les Iles du Haut Rhône, 1 oiseau le 20/1/1996 (J.P.Drevon, K.Funkiewiez, C.Deliry), celui-ci ne fait que passer et ne s'installe pas sur le dortoir des Cormorans qui était effarouché ce soir-là par des coups de fusil.

## HERON CENDRE

*Ardea cinerea*

Ir!

Quasi menacé

Sédentaire, signalé nicheur sur les Iles du Rhône dès 1971 (30 couples), en progression (200 nids aujourd'hui). Premières éclosions le 15/3. Nicheur exceptionnel et isolé au Lac Clair (1987) et l'étang du Puy de Né (1989). Erratisme important. La progression est générale, rare dans les années 60, régulier dès 1977 et fréquent dès 1982.

Outre le site des Iles du haut-Rhône où existe une importante colonie, il est possible d'ajouter aux données ponctuelles du lac Clair (nid en 1986) et de l'étang du Puy de Né (nids en 1987), **un nid isolé à Hières sur Amby** le 7/4/1995 (J.F.Noblet), ainsi qu'un oiseau **transportant des matériaux sur son nid** où se trouvait un autre oiseau, **au Gabelon sur St Savin**, le 4/3/1996; il pourrait y avoir 4 nids sur ce site, au moins 2 probablement (C.Deliry).

Notons un nombre important aux étangs de la Serre, le 20/9/1995, avec **37 individus** (G.Verdin).

## HERON POURPRE

*Ardea purpurea*

LrE LR En Danger

Espèce migratrice et nidificatrice (III; 1/4-15/9). Sa nidification est mal connue, jusqu'à 10 couples dans les années 80 au marais de l'Ambossu, en voie d'assèchement (site connu depuis 1972). Les sites potentiels ou connus, actuels sont l'étang de Salette, l'étang de Mépieu et celui de Charamel.

Premier en 1993, le 13/4 aux étangs de la Serre (G.Verdin). Premier Héron pourpre fin mars, en 1995 (date d'arrivée connue par ailleurs : 1/4 en 1977). En 1996 : 1 oiseau aurait été observé du 1 au 2/2, ce qui correspondrait à une donnée exceptionnelle, aux étangs de la Serre (Garde du Sival).

Statut "?" à reporter en hiver.

Des mouvements d'automne sont constatés, avec 7 oiseaux en formation, le 7/9/1995 aux Iles du Rhône (C.Deliry).

Notons un cas d'accouplement le 7/4/1995 à l'étang de Salette (J.F.Noblet, C.Borel et B.Pedroletti). L'espèce est présente en période de nidification au Grand étang de Mépieu en 1995 (R.Quesada). Sur l'étang de Salette sur lequel nos dernières informations, révélaient 1 couple en 1981, la nidification est prouvée avec cris de jeunes nourris sur un nid le 22/6/1995 (C.Deliry).

Nous noterons un cas de capture de jeune Foulque au nid, le 21/5/1995, sur l'étang de Salette (R.Quesada)!

## CIGOGNE NOIRE

*Ciconia nigra*

LrE

3 observations printanières sur le plateau (6/4/1984, 10/4/1994 et 24/4/1983) : migration.

1 observation en période de nidification, réalisée le 24/6/1995, vers l'étang de Lemps (S.Stéfaniak, D.Loose, J.F.Noblet, C.Deliry), est d'autant plus intéressante que des "locaux" auraient observé l'espèce vers l'étang de Billonay à la même période en 1994.

## CIGOGNE BLANCHE

*Ciconia ciconia*

LrE

Espèce migratrice notée aux deux passages, avec de 1 à 3 individus au printemps (4/4-4/5), essentiellement à l'est entre Lancin et le Rhône, passage mieux étoffé en automne (VII-IX). Record 50 le 20/8/1968. Fléchissement de la fréquence et du nombre d'individus après les années 60.

2 précoces le 9/3/1993 au Bouchage (Guy Verdin) (record 28/2/1963, en général début avril).

Nous savons que le passage d'automne est plus fourni : un groupe important de 21 oiseaux à Chapèze sur St Savin le 21/8/1994 (B.Françon). En 1995 elles étaient 6 à Bourgoin, présentes à Montalieu, mi-août (presse locale), aux Avenières, notées les 7 et 8/9 (Lo Parvi).

## IBIS SACRE

*Threskiornis aethiopicus*

Une seule observation récente (date à préciser) sur le Rhône à Brangues. Un individu vraisemblablement issu du parc de Villars-les-Dombes.

## FLAMANT ROSE

*Phoenicopterus ruber*

LrE

Espèce notée une fois au cours de l'hiver 1993. Est-il échappé de captivité? Notons qu'un oiseau bagué en Camargue a été observé en Basse vallée de l'Isère.

## CYGNE TUBERCULE

*Cygnus olor*

LrF LR Vulnérable

Espèce nidificatrice sédentaire, non signalée dans les années 60 et début 70, donnée dès 1977. Hivernage faible (moins de 50 individus). Record sur l'étang de Mépieu, de 35 le 15/9/1990. Premier cas de nidification signalé en 1981, depuis le nombre de sites connus ne cesse d'augmenter doucement.

Nouveau site de nidification aux carrières de Champdieu, sur Mépieu, avec 2 adultes et 2 jeunes le 23/7/1995 (R.Quesada).

## OIE DES MOISSONS

*Anser fabalis*

1 observation le 13/1/1985 à Mépieu.

Nous nous devons de préciser que l'unique observation pour l'Isle Crémieu d'Oie des moissons, le 13/1/1985 à l'étang de Mépieu, (signalée précédemment, DELIRY, 1995), concernait un unique individu.

Un groupe en formation de 15 oiseaux, observés le 24/2/1996 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry), semblent devoir être rapportés à cette espèce, mais un doute subsiste sur l'identité de l'espèce!

## OIE CENDREE

*Anser anser*

LrF

2 observations : 10 à Brangues le 13/12/1986 et 2 sur l'étang Frignon le 29/3/1987. Individus domestiques sur les étangs de la Serre (1989...) et le Lac de Charviat.

## TADORNE CASARCA

*Tadorna ferruginea*

LrE

Espèce non signalée jusqu' alors.

Un oiseau aurait été observé par F.Micouloud sur le Rhône en 1993, nous devons apporter des précisions ultérieurement sur cette donnée. Espèce nouvelle pour l'Isle Crémieu.

## TADORNE DE BELON

*Tadorna tadorna*

8 observations au total (14/12-12/2) en période hivernale, cependant le record de 13 à Vézeronce concerne le 22/8/1986.

Données particulièrement **précoces** pour nous, 1 immature présent à la Vallée Bleue les 14, 19 et 22/9/1995 (G.Verdin), suivies de quelques observations irrégulières, l'individu vraisemblablement le même est toujours présent le 8/1/1996 (G.Verdin), mais plus remarquable encore le **17/3** (G.Leblais, P.Lluch et C.Deliry). Il s'agit de la **neuvième donnée** de l'espèce dans l'Isle Crémieu et d'un **record de durée de stationnement**, du 14 au 17/3 (informations disponibles jusqu'alors : 14/12 au 12/2).

<sup>13</sup> **Dizième donnée crémolane**, avec 2 individus en amont de la centrale de Creys-Malville, sur le Rhône, fin février 1996 (F.Micouloud), oiseaux assez tardifs.

## AIX MANDARIN

*Aix galericulata*

Espèce récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y est possible.

## CANARD CAROLIN

*Aix sponsa*

Espèce récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y est possible.

## CANARD SIFFLEUR

*Anas penelope*

Espèce notée au passage d'automne (22/9, X-...). Records de 8 les 5/3 et 22/12/1988. Présente en hivernage.

Premières **données franchement printanières** dans l'Isle Crémieu : 1 mâle le 28/3/1994, 4 mâles et 2 femelles le 29/3 et 1 mâle le 26/4 (très tardif) aux étangs de la Serre (G.Verdin). Notons par ailleurs 1 mâle et 3 femelles le 23/3/1995 à l'étang de Salette (G.Verdin) et 3 mâles immatures le 17/3/1996 aux carrières de Champdieu (P.Lluch, G.Leblais et C.Deliry) et 1 mâle **tardif**, sur St Didier d'Aoste le 2/4 (C.Deliry). Ceci permet de situer la date de fin de passage au 2/4 et exceptionnellement au 26/4 (début en février).

Pour le **passage automnal** peu connu, notons 1 mâle en plumage d'éclipse, le 22/9 à la Vallée Bleue (G.Verdin) et 2 individus à l'étang de Salette le 24/11/1995 (G.Verdin). Si ces données sont très ponctuelles, elles permettent d'estimer une fourchette de passage entre fin septembre et fin novembre au moins.

## SARCELLE D'HIVER

*Anas crecca*

LrF LR En Grave Danger

Espèce notée aux deux passages (11/8; 3/9...) (III-IV; 10/5) et en hivernage (XI-III; 5/4). Record de 130 le 11/2 et 12/12/1979 sur l'étang de Salette. Encore 30 le 5/4/1977 aux étangs de la Serre. Nidification (6 couples environ) de 1968 à 1977.

4 mâles et 2 femelles **assez tardifs** le 25/3/1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin). En mars 1995 diverses observations pendant tout le mois à l'étang de Salette, témoignent de la période de migration (Pinto & Chardonnet, C.Deliry, G.Verdin), il y a même des **attardés le 29/3** avec 3 individus (G.Verdin). Cette donnée semble en continu avec le flux migratoire qui doit être reconsidéré entre le 18/2 (1994) et le 29/3 (1995).

## CANARD DE BARBARIE

*Anas moschata*

Espèce introduite, observée en relative liberté, notamment au Lac de Charvieu et, au Moulin de Peillard (St Romain de Jalionas).

## CANARD COLVERT

*Anas platyrhynchos*

Espèce sédentaire, nidificatrice avec 100 à 200 couples dans les années 70, au moins une 100aine aujourd'hui. Groupes en éclipse au cours de l'été. En hiver record de 200 le 18/12/1978 à l'étang de Salette; en général 200 au total.

**Nichées dès le 13 avril** en 1993 aux étangs de la Serre, où 4 nichées de 12, 6, 8 et 5 poussins sont notées en avril (G.Verdin).

C.Grangier souligne l'importance des **lâchers cygénétiques** de cette espèce dans l'Isle Crémieu : par exemple un centaine lors de l'hiver 1994-95 selon un chasseur, sur l'étang de Ry, mais aussi d'après des informations des années 80, sur l'étang de Chêne et le domaine de Meyrieu (Creys-Mépieu). Nous ne citons que les informations qui nous sont parvenues!



- Sarcelle d'hiver ♂ -

## CANARD CHIPEAU

*Anas strepera*

LrE

Espèce présente aux deux passages (X-...), le maximum serait en XI d'après l'atlas du CORA, (III-IV), et en hiver. Record de 6 en hiver le 20/11/1983 et de 25 puis 16 le 21/10/1993.

Complément d'information pour le **passage de printemps** : 1 couple aux étangs de la Serre du 13 au 25/3/1993 (G.Verdin). En 1994 le passage peut y être encore mieux suivi : 1 mâle le 17/2, 1 le 18, 2 mâles et 1 femelle le 22 et 24, 3 mâles et 1 femelle du 28 au 4/3 (G.Verdin). En 1995 diverses observations pendant tout le mois de mars à l'étang de Salette (C.Deliry & G.Verdin). Nous devons estimer un passage entre le 17/2(1994) et avril et considérer l'espèce comme **AC au printemps**.

Pour l'**automne**, une donnée du 19/9, avec 3 individus à la Vallée Bleue est désormais **la plus précoce** que nous ayons (premiers en octobre avec la date du 16/10/1994 citée par exemple); le cas n'est pas isolé car 2 individus ont été signalés par ailleurs le 22/9/1995 (G.Verdin).

Sur l'étang Neuf, le **record hivernal de 6 individus** est égalé, le 6/12/1994 (C.Grangier, K.Funkiewicz, P.Giraud et C.Deliry).

## CANARD PILET

*Anas acuta*

LrE

Espèce notée aux deux passages (X-XI) (10/2-14/3; 4/4) et en hivernage (XII). En automne et hiver seulement sur les étangs de la Serre (1 donnée à Ecorcheboeuf). Record : 20, le 14/3/1976. 1 mâle le 7/6/1975.

1 couple le 21/2/1994 à Brangues et 1 mâle le 4/3 aux étangs de la Serre (G.Verdin); c'est pendant le **passage printanier** noté en général entre le 10/2 et le 14/3. Sur ce même étang, **17 oiseaux** avaient stationné 5 jours en mars-avril 1992 (G.Verdin).

## SARCELLE D'ETE

*Anas querquedula*

LrE

LR En Grave Danger

Espèce présente aux deux passages (1/9...), mais préférentiellement au printemps (5/3-20/4; 9/6). Présence sporadique en période de nidification, nicheur certain le 6/5/1991 aux étangs de la Serre (4 poussins et 1 femelle couvant). Encore 12 le 9/6/1981 à Chatanay.

4 femelles et 8 mâles constituent un **record** (équivalant les 12 individus signalés à Chatanay le 9/6/1981), notés le 25/3/1993 aux étangs de la Serre; **record nettement battu** le 26/3/1994 à Brangues avec **39 mâles et 18 femelles** (G.Verdin).

**Très précoces** : 3 mâles le 28/2/1994 sur le même site, présents jusqu'au 4/3 (précédent record 5/3/1989), de plus 4 mâles et 1 femelle le 21/3, 3 mâles le 29/3 et 2 le 30/3, sur le même site (G.Verdin). En 1995 les 12 premières (beau groupe, mais tardif) sont notées le 8/4/1995\* (F. & G.Bourguelat). Les premières en 1996 concernent 2 couples à l'étang de Salette, le 9/3 (G.Verdin). \*étang de Salette

## CANARD SOUCHET

*Anas clypeata*

Espèce notée aux deux passages (3/9...) (III, 25/3-30/3; 16/4) et en hivernage (9/11...). Record de 7 le 21/3/1978. Parades à Gouvoux en 4/1974.

**Observations tardives** de 3 mâles et 2 femelles le 25/3 et d'un couple le 13/4/1993, aux étangs de la Serre (G.Verdin). **Stationnement prolongé** d'un mâle dès le 28/1/1994, accompagné d'un 2ème dès le 31/1 jusqu'au 20/2 aux étangs de la Serre, dès lors 2 mâles et 1 femelle jusqu'au 26/2 et 7 mâles et 2 femelles jusqu'au 4/3, ils sont 8 mâles et 3 femelles le 9/3, 4 mâles et 2 femelles le 21/3, 5 mâles et 1 femelle le 26/3, 13 mâles et 11 femelles le 28/3, 4 mâles et 2 femelles le 29/3 et 6 mâles et 6 femelles le 30/3 (G.Verdin).

A l'**étang de Salette**, l'espèce est notée en période de migration en 1995, avec stationnement de 2 mâles et 5 femelles le 17/3 (C.Deliry, G.Verdin), 3 mâles et 3 femelles le 20/3 (G.Verdin) ainsi que **précocément** en 1996, avec 2 individus le 15/2 (G.Verdin).

Ces nombreuses observations aux nombres fluctuants sont révélatrices de **mouvements de l'espèce à situer du 15/2 au 30/3** (record précédent 25/3/1993, l'espèce est exceptionnelle plus tard). Pendant la même période 5 mâles et 3 femelles sont notés le 26/3/1994 à Brangues (G.Verdin).


Notons que les **24 individus** du 28/3/1994 constituent un **record quantitatif très net** (précédent record 7 individus à Ecorcheboeuf le 21/3/1978).

## SARCELLE MARBREE

*Marmaronetta angustirostris*

LrE

1 seule donnée d'un individu peu farouche lors de l'été 1993 aux étangs de la Serre.



## NETTE ROUSSE

*Netta rufina*

LrE LR En Grave Danger

Espèce essentiellement hivernante (12/11-5/3; mi-III), irrégulière et en faible nombre. Quelques dates sortent de ce cadre (25/8, 2/9, 19/3, 30/3, IV, 9/5), précoces ou attardés semble-t-il. Introduction aux étangs de la Serre qui se solde par l'appariement d'une femelle avec un mâle sauvage en 1991 (échec).

Des observations de G. Verdin aux étangs de la Serre permettent d'avoir de précieuses précisions sur la femelle éjointée qui y avait été introduite. Il a constaté que **sa présence attirait les Nettes sauvages**, tout d'abord des mâles (jusqu'à 9 à la fois), qui eux-mêmes attiraient des femelles. Les petits que cette femelle avait, étaient mal soignés et tout au plus 1 ou 2 en réchappait. **En 1992 une nichée de 4 jeunes** à l'envol et en **1993 une nichée de 10 jeunes** à l'envol ont été notées de la part de femelles sauvages (passer en statut "rare" en été). **Ces données sont remarquables, les premières en Isère à notre connaissance et exceptionnelles dans la région Rhône-Alpes en dehors de la Dombes.** La femelle éjointée est morte et très peu de Nettes ont été observées en période de nidification en 1994 (1-2 mâles les 26 et 27/4) et aucune en 1995, *comme si l'attraction avait cessé*. La nichée de 1993 est confirmée par R. Quesada qui signale 9 jeunes accompagnés d'une femelle le 21/5/1993. Si l'oiseau n'a pas été observé par G. Verdin en 1995 sur les étangs de la Serre, cela n'a pas été le cas sur Creys-Mépieu, à la **carrière de Champdieu**, où plusieurs observations en période de reproduction de mâles et de femelles ont été faites (R. Quesada), par exemple 4 individus le 12/3 (X. Vaillant, A. Provost, S. d'Herbomez, C. Deliry), 1 mâle tardif le 23/4 (J.P. Drevon).

Ce **site particulièrement attractif pour les Nettes** semble-t-il montre à nouveau 4 individus le 1/10/1995 (J.P. Drevon). Notons cependant que pour 1995, 3 mâles et 1 femelle étaient présents sur les étangs de la Serre le 2/3 (C. Deliry), et 1 mâle en mai (J.P. Drevon). **En 1996** le phénomène se renouvelle sur le site de Champdieu, avec 3 mâles et 1 femelle le 17/3 (C. Deliry, G. Leblais et P. Lluch).

## FULIGULE MILOUIN

*Aythya ferina*

LrD LR En Danger

Espèce migratrice et hivernante (15/8-8/4; 6/5), les périodes de passage sont mal définies. Absente à l'étang de Salette jusqu'en 1969, indice de rareté à l'époque, l'hivernage débute dès les années 70 avec souvent plus de 100 individus et plus depuis l'aménagement de Sault-Brénaz sur le Rhône. Record 550 le 8/12/1988 à la Vallée Bleue. En contrepartie des sites semblent désertés comme l'étang de Mépieu. Les records sont par ailleurs de 124 sur l'étang de Ry le 19/1/1986 et de 110 sur l'étang de Mépieu le 16/3/1986. En période de nidification dès 1968, nicheur certain dès 1971. Mal suivie la nidification, doit être régulière pour un petit nombre de couples (dernier cas signalé en 1990 à l'étang Neuf). Un hybride Milouin x Morillon, le 15/1/1989.

**Un couple en période de nidification** sur un nouveau site de Mépieu, le 8/5/1995 (R. Quesada).

**Déjà 60 le 8/9/1995** aux étangs de la Serre (G. Verdin) et 20 les 9 et 10/9/1995 sur les carrières de Champdieu (J.P. Drevon), permettent de situer un peu mieux les premiers mouvements de l'espèce.

Un groupe de 20 Milouins sur le Rhône à Brangues le 14 et de 77 à l'étang de Salette le 15/2/1996 semblent relever du début de la **migration printanière** (G. Verdin). Celle-ci se poursuit et est révélée par 12 individus à l'étang Neuf et 42 à l'étang de Ry, sur la commune de Siccieu, le 27/2 (C. Grangier).

## FULIGULE NYROCA

*Aythya nyroca*

LrE

Hivernant irrégulier (XI; 15/12-16/3), essentiellement noté en XII. Précoce et record de 3 individus, le 21/10/1988 à l'étang Neuf. 2 couples sur l'étang de Mépieu le 25/5/1978, mais nidification non prouvée.

1 mâle le **16/2/1994** aux étangs de la Serre (G. Verdin). 1 **précoce** le 14/9/1995 à la Vallée Bleue (G. Verdin), nous ne pouvons pas le considérer comme étant de la période hivernale donnée essentiellement entre le 16/12/1984 et le 16/3/1986, mais ceci suggère l'existence d'une période favorable au **passage postnuptial** à relier avec les 3 individus jugés précoces vus à l'étang Neuf le 21/10/1988, à situer **en septembre et octobre**.



## FULIGULE MORILLON

*Aythya fuligula*

LrF

Espèce hivernante (3/10-5/4), l'hivernage était faible avant l'aménagement de la Vallée Bleue, désormais régulièrement plus de 100 individus (record sur ce site de 406 le 8/2/1990). Le site de l'étang de Mèpieu a été récemment déserté en hivernage. Présence plus tardive de IV à VI sur l'étang de Mèpieu et Creys-Mèpieu, et une fois sur Siccieu (dates entre 1978 et 1988). Aucune preuve de nidification cependant.

Au **passage printanier** le 31/3/1994 aux étangs de la Serre avec 1 couple (G.Verdin). 1 mâle le 5/3/1995 à l'étang de la Salette, lieu où l'espèce est rare (F. & G. Bourguelat). Les mouvements commencent vraisemblablement **plus tôt encore**, comme en témoignent les observations de 3 individus à l'étang Neuf et 1 à l'étang de Ry, le 27/2/1996 (C.Grangier), deux sites où cette espèce est peu, voire n'a jamais été notée. Cependant, les recherches faites récemment indiquent un nombre non négligeable de données sur ces sites (C.Grangier) : 4 le 9/3/1982, 1 le 15/3/1982, 1 le 9/3/1985 et 1 les 12 et 13/3/1986 sur l'étang de Ry, 2 le 7/4/1984 et 4 le 31/10/1988 sur l'étang Neuf (non cité par THOMAS-BILLOT, 1991). Ces données étaient passées inaperçues et concernent essentiellement un passage printanier en mars.

**Stationnement** d'un groupe d'une dizaine de Morillons tardifs fin mars-début avril en 1996 à proximité de l'île des Noyers, avec 12 individus notés le 7/4 (D.Loose et C.Deliry). La date la plus tardive disponible est celle citée ci-dessus le 31/3/1994. Cependant des individus attardés avaient déjà été notés sur Mèpieu en mai et juin 1978 et 1979, et en avril 1986 et 1988 (DELIRY, 1995).

Pour l'**automne**, une dizaine d'individus signalés le 19/9/1995 à la Vallée Bleue (G.Verdin), constituent un nouvelle date d'**arrivée précoce** (date précédente 3/10/1982) et suggère vraisemblablement un passage postnuptial qu'il nous reste à mettre en évidence.

## FULIGULE MILOUINAN

*Aythya marila*

LEw

4 observations hivernales (22/12-14/2).

Nous noterons **un peu en dehors de l'Isle Crémieu** le côté attractif du plan d'eau de Murs et Gélignieux (01) sur le Rhône, encore nommé plan d'eau de Cuchet où 1 mâle et 2 femelles furent notés le 7/1/1995 lors d'une sortie de Lo Parvi (P.Giraud & C.Deliry).

**5ème donnée crémolane**, avec 2 individus à l'étang de Salette, le 24/11/1995 (G.Verdin).

## EIDER A DUVET

*Somateria mollissima*

LrF

1 seule observation le 5/3/1989 (étang de Ry, Siccieu). A proximité signalé exceptionnellement en hiver.

Une donnée signalée dans l'Histoire des oiseaux de l'Isle Crémieu (DELIRY, 1995) sur le Rhône à **Sault-Brénaz** en 1988 ou 1989 devrait être incluse dans notre secteur, soit un total de **2 données crémolanes**. Espèce **accidentelle (R) en hiver**.

## HARELDE

*Clangula hyemalis*

1 seule observation de 4 oiseaux le 30/1/1986 à l'Isle d'Abeau.

## MACREUSE BRUNE

*Melanitta fusca*

LEw

Espèce exceptionnelle notée en automne 1988 (12/11-27/11), avec 4 observations à la Vallée Bleue en 1988 (record 10 le 17/11) et la même année 1 mâle à Brangues le 22/11.

## GARROT A OEUIL D'OR

*Bucephala clangula*

Peu de données, il s'agit d'une espèce hivernante en très faible nombre (XI, 30/11-13/12), notée de plus au printemps (II-III).

Si nous avons peu de données sur notre district naturel, ce n'était pas le cas sur le **Bassin de Jonage**, non loin de chez nous, où l'espèce était assez régulière, selon C.Grangier, dans les années 70 au moins.

**Au faible nombre de données initiales s'ajoutent** une femelle le 18/12/1994 sur la Vallée Bleue (CORA-38) et le **record de 4 individus** sur le même site le 15/1/1995 (CORA-38). La date la plus tardive disponible du 13/12 en 1993 devra être remplacée par celle-ci.

## HARLE PIETTE

*Mergus albellus*

LrE

3 observations hivernales les 15/2/1983, 17/2/1987 et 16/1/1994, toutes à l'est de l'Isle Crémieu et cartographiées en hiver sur Bourgoin-1/50000°.

**4ème observation de l'espèce dans l'Isle Crémieu** : 1 femelle le 12/3/1993 aux étangs de la Serre, présente depuis janvier (G.Verdin), **tardive** (record précédent 17/2/1987).

## HARLE HUPPE

*Mergus serrator*

Non signalé jusqu'alors dans l'Isle Crémieu.

**Accidentelle**, cette **espèce nouvelle pour l'Isle Crémieu** a été notée le 16/11/1994 à la Vallée Bleue (1 femelle)(G.Verdin). Statut **rare à reporter en hiver**.

## HARLE BIEVRE

*Mergus merganser*

LrF

Espèce notée aux deux passages, une fois en IX, beaucoup plus régulièrement au printemps (III-...; 28/4). Elle est de plus hivernante irrégulière (22/11-20/1). La plupart des données concernent Brangues (12aine), sinon essentiellement sur le Rhône (4 autres données), 2 données aux étangs de la Serre. Plus fréquentes depuis 1988, notons que l'espèce est en expansion sur le bassin lémanique et désormais dans les départements savoyards. Record de 11 le 21/2/1988 à Brangues.

La présence récente d'**oiseaux nicheurs sur le Rhône un peu en amont du confluent du Guiers** (CORA-Ain), mérite toute notre attention; la **progression** de l'espèce semble continuer sur le Rhône. En décembre 1995 l'espèce a été observée deux fois dans le défilé de la Balme sur Virignin (01) avec jusqu'à 6 individus (C.Deliry).

**Nouvelles observations pour les étangs de la Serre** : 1 mâle stationnant 15 jours en décembre 1992 chassé par un coup de gel, 1 mâle le 17/2/1994 et 1 femelle le 7/3 (G.Verdin), ce qui situe les **premiers mouvements** à cette date (précédent record 1/3/1990). 1 couple à Brangues, site traditionnel pour cette espèce, le 7/3/1994 (G.Verdin).

## ERISMATURE ROUSSE

*Oxyura jamaicensis*

1 observation hivernale le 19/12/1982 sur Mépieu.

## BONDREE APIVORE

*Pernis apivorus*

LrD

Quasi menacé

Espèce migratrice et nidificatrice (6/4-30/9; 10/10). Nidification non rigoureusement prouvée, quoique très vraisemblable (30/5-VII; VIII) : une 20aine de sites suspectés à l'est et au sud-est du district, maximum simultané de 6 stations en 1985. Seulement quelques rares couples nicheurs dans les années 70.

La date de départ automnal est proposée au 30/9 (1993) cependant nous possédions une donnée tardive du 10/10 en 1965. **L'observation du 26/10/1994 est donc de loin la plus tardive** dans le secteur (C.Deliry, K.Funkiewiez).

**Au printemps** : premières tardivement notées le 27/4/1995 à la Chapelle de la tour (C.Deliry) (date d'arrivée connue : 6/4/1981).

## MILAN NOIR

*Milvus migrans*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice (12/2, 20/2, en général déb. III-9/9; 8/10), très irrégulière en hiver (4 données, 3 en XI, 1 en XII de 1981 à 1987 à mettre en rapport à une tendance récente à l'hivernage en France). Les mouvements d'automne sont entamés en VIII (15/8) et se poursuivent nettement que jusqu'à la fin de ce mois (pas de donnée de IX!). Vraisemblablement non nicheuse au XIX<sup>s</sup>, elle présente de façon stable plusieurs 10aines de couples depuis les années 70.

En 1993 le **premier** est signalé assez tardivement le 10/3 à Hières sur Amby (Lo Parvi), de même qu'en 1995 et 1996, 6 premiers oiseaux le 9/3/1995 sur les Iles du Rhône (C.Deliry), premier le 9/3/1996 à Aoste (C.Deliry)(date la plus précoce le 20/2/1979, record 12/2/1987), l'arrivée régulière n'est notée que vers la mi-mars. Ceci semble confirmer qu'outre des cas particuliers, **l'arrivée de l'espèce se fait en général début mars** (DELIRY, 1995).

Le **passage de printemps en 1996, révèle la mise en place de dortoirs** au niveau du Haut-Rhône avec 6 individus le 29/3, 30 le 31/3, 10 le 4/4 et **70 (groupe exceptionnel) le 5/4** (C.Deliry). Ceci situe un **pic de passage fin mars-début avril**.

Nous ne possédions pas de **date de départ** précise pour cette espèce, tout au plus avons nous des informations sur des mouvements entamés le 15/8 en 1983. Toujours est-il qu'un Milan noir a été noté le 9/9/1994 à l'étang de Salette (C.Deliry). Ceci est sans compter avec la date franchement plus tardive du 8/10/1993 (DELIRY, 1995).

Aux 4 **données hivernales** déjà connues (20/12/1981, 9/11/1983, 26/11/1985 et 9/11/1987) (DELIRY, 1995) il faut ajouter l'observation d'un Milan noir, le 7/1/1996 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry). Il s'agit avec la donnée du 20/12 réalisée à Creys, de l'information la plus hivernale disponible.

## MILAN ROYAL

*Milvus milvus*

LrD

LR En Grave Danger

Espèce notée aux deux passages (VIII-XI) (6/3; IV-V). En période de nidification noter la parade de 2 couples le 14/6/1979 et 1 oiseau le 20/6/1988. L'espèce est sporadique, parfois quasi régulière en hiver.

**Au printemps**, 1 le 20/5/1995 à l'étang de Bas (C.& P.Juliand, K.Funkiewiez, S.Charles, C.Deliry), le même jour, 1 individu sur Optevoz (P.Giraud). Cette date correspond à la fin de la période de migration pré-nuptiale qui débute en avril (record le 6/3/1982).

**Pour l'automne**, 2 le 19/9/1995 à Siccieu (C.Grangier).



## PYGARGUE A QUEUE BLANCHE

*Haliaeetus albicilla*

LrE

1 immature en compagnie d'un Aigle criard en 1983 (5/12-14/12) et noté avec doutes les 2 (et 12/4?) en 1977 sur Brangues.

Il semble utile de préciser que le Pygargue observé en 1983 en compagnie d'un Aigle Criard l'a été sur le **Grand étang de Mépieu**. Ceci avait été omis précédemment (DELIRY, 1995).

## VAUTOUR PERCNOPTERE

*Neophron percnopterus*

LrE

De passage régulier sur Miribel au XIX<sup>e</sup>, le Percnoptère devait passer chez nous avant de rejoindre ses fiefs désormais disparus des départements savoyards.

## CIRCAETE JEAN LE BLANC

*Circaetus gallicus*

LrE

LR En Danger

Espèce migratrice, avec des données éparses en été (erratiques venant du Bugey?) (21/3-27/9). La nidification est donnée certaine de 1972 à 1979 à Hières sur Amby (voir plus loin). Nicheur possible actuellement.

Selon une enquête d'O.Waille les données de nidifications faites sur 4 années de 1972 à 1979 (DELIRY, 1995) ne correspondraient pas à des preuves certaines.

Notons à ce sujet un **couple alarmant** vers l'étang de Ga le 24/6/1995 (C.Deliry, D.Loose, S.Stéfaniak).

Un Circaète est donné **fin septembre 1994** à l'étang de Lempis, sans précision de date (F.Micouloud). Notons que la date la plus tardive est celle du 27/9/1989.

Au **printemps**, en 1995, 2 premiers tardifs, le 6/4 sur Dizimieu (C.Deliry), signalé beaucoup plus tôt en 1996, c'est un **nouveau record le 12/3** à Poleyrieu (M.Bourbon) (première date : 21/3/1992; ancien record 16/3/1986). Semble **encore migrer** le 20/5/1995, à l'étang de Bas (K.Funkiewicz, P.& C.Juliand, S.Charles, C.Deliry).

## BUSARD DES ROSEAUX

*Circus aeruginosus*

LrD

LR En Danger

Espèce migratrice et estivante sporadique (7/4-28/9). Démonstrations de nidification (transports de matériaux, parades) sans suites en 1973, 1984, 1985 (étangs de Charamel et de Mépieu, marais de Boulieu); nidification dans les années 80 sur le marais de l'Ambossu, aujourd'hui "asséché". Pas de preuve récente. Le passage peut se faire loin des étangs comme par exemple dans la plaine de Satolas. Une donnée hivernale exceptionnelle, le 12/1/1986.

Noté au **passage printanier** aux étangs de la Serre en 1993 et 1994 (G.Verdin), ainsi qu'en 1995 sur l'étang Neuf (R.Quesada). L'arrivée à l'étang de Salette se fait le 12/3 en 1995 avec 2 femelles (X.Vaillant, A.Provost, S.d'Herbomez, C.Deliry), ensuite l'espèce sera assez régulière tout le printemps (date d'arrivée connue le 7/3 en 1990). Il sera beaucoup plus tardif et moins régulier en 1996, le premier n'étant signalé que le 4/4 à Morestel, migrateur (C.Deliry).

Au **passage automnal**, 1 migrateur net le 24/9/1994 à l'étang de Salette (C.Deliry).

## BUSARD SAINT MARTIN

*Circus cyaneus*

LrE

Quasi menacé

Espèce présente toute l'année (sauf une partie de l'automne?) dont la nidification connue sur divers sites de plaine dans les années 60, régresse lors de la décennie suivante, elle semble relictuelle dans les années 80 bien que citée sur 16 sites. Les meilleurs milieux de plaine sont altérés et désertés. Le passage de printemps est sensible (III), mais discret en automne, peu noté par ailleurs de fin VIII à fin IX, de retour en X. Dortoirs hivernaux connus à Hières sur Amby (1989, 1994; record de 4 individus) et l'étang de Charamel (1988; record de 7 individus).

Outre les deux **dortoirs** précédemment signalés à Hières sur Amby (1989 et 1994) et l'étang de Charamel (1988) (DELIRY, 1995), R.Quesada nous signale un dortoir connu de longue date, occupé par 4 à 6 individus aux **Leschères de la Gorge** sur Creys-Mépieu, lieu où l'espèce se reproduit (in litt. du 22/6/1995). Au dortoir du lac d'Hières sur Amby, 6 oiseaux sont présents le 25/3/1995 (P.Giraud).

**Passage automnal** sensible et net à l'étang de Salette le 24/9/1994 où 6 individus différents sont vus en 1h30, vol migratoire (C.Deliry).

En **période de nidification** notons 1 couple paradant sur le plateau au nord de Salagnon, le 1/4/1995 (Comm.Faune de Lo Parvi).

## BUSARD CENDRE

*Circus pygargus*


Ir!

Mesures de protect.

Espèce migratrice et nidificatrice en régression (14/3-15/8). Régulière jusqu'en 1975 sur les mêmes sites de plaine que le Busard St Martin, disparue depuis, elle est aujourd'hui limitée au secteur de Satolas de découverte récente (4 couples en 1989).

**Peu de données.** 1 mâle vers Arandon le 20/4/1993 (G.Verdin). 1 femelle, en période de nidification, le 25/6/1995 sur Vernas (R.Quesada, J.F.Noblet). 1 mâle au marais de l'Epau, le 7/5/1995 (R.Quesada).

Alors que nous avons peu, sinon pas d'information sur sa **migration**, notons 1 individu au passage à l'étang de Salette le 24/9/1994 (C.Deliry).



## AUTOUR DES PALOMBES

*Accipiter gentilis*

LrD LR Insuffisamment documenté

Espèce sédentaire, présentant un faible passage d'automne (17/10-15/11), quasiment accidentelle toute l'année.

Nous pensons utile de **préciser les 4 secteurs** où l'espèce a été signalée récemment en période de nidification, afin de faciliter les recherches futures. Il s'agit du plateau de Larina et du secteur de Hières sur Amby, Creys-Mépieu vers la Gorge et vers le grand étang de Mépieu, Siccieu vers l'étang de Ry. Nous pouvons **compléter** cela par des observations répétées sur **Aoste**, lors de l'été 1995, au niveau de la Paluette (C.Deliry).

Encore un cas clair de **migration automnale** : 1 individu le 24/9/1994 à l'étang de Salette (C.Deliry). Il est délicat de préciser encore la fourchette de migration à cette époque évaluée entre le 17/10 et le 15/11 au moins, ce cas pourrait correspondre à un **mouvement très précoce**.

## EPERVIER D'EUROPE

*Accipiter nisus*

Espèce sédentaire, nidificatrice, montrant des mouvements vraisemblables en automne. L'espèce est assez rare en nidification dans les années 70 (5 sites), présente aujourd'hui sur une vingtaine de sites, une progression qui était déjà signalée lors d'une révision de l'Atlas du CORA (1980-82).

## BUSE VARIABLE

*Buteo buteo*

Espèce sédentaire aux hivernages renforcés par des flux extérieurs irréguliers. En période de nidification, seulement 10 couples, mais peu d'informations. Deux passages sensibles (X) (III). Record de 20 ensemble le 19/1/1986. 2 observations d'individus à aspect proche de la Buse vulpine.

Lors d'une journée de **migration** exceptionnelle à l'étang de Salette, le 24/9/1994, **43 individus** différents sont notés au passage en 1h30 (C.Deliry).

## BUSE PATTUE

*Buteo lagopus*

1 donnée douteuse à Arandon du 15/1/1978.

## AIGLE CRIARD

*Aquila clanga*

LrE

1 immature a été observé diverses fois entre le 2 et le 20/12/1983, notamment sur l'étang de Mépieu en compagnie d'un Pygargue. Erratique il a été noté sur le marais de l'Ambossu, les étangs de la Serre et au pont de Briord. Une donnée douteuse concerne 4 observations du 5 au 11/4/1984 à Creys.

## AIGLE ROYAL

*Aquila chrysaetos*

LrE

LR Vulnérable

5 observations de cette espèce : 2 en IX, 1 en X (14/10), donc automnal (?), 1 en V et 1 en VII. Parade surprenante aux étangs de la Serre le 21/5/1978.

Les recherches menées permettent d'attribuer les 2 Aigles royaux paradant aux étangs de la Serre le 21/5/1978, déjà cités (DELIRY, 1995) à F.Savin.

Encore **une donnée d'Aigle royal en erratisme automnal** (1 immature), **4ème cas crémolan**, le 14/10/1994 à l'est de Morestel (C.Deliry). Celle-ci est la plus **tardive** que nous possédions (record précédent 27/9/1989 à Crucilleux).

## AIGLE BOTTE

*Hieraaetus pennatus*

LrE

1 observation seulement, le 13/3/1989 à Crémieu.

## AIGLE DE BONELLI

*Hieraaetus fasciatus*

LrE

Une donnée douteuse concerne 7 contacts du 3 au 11/4/1984.



- Aigle royal, immature -

## BALBUZARD PECHEUR

*Pandion haliaetus*

LrE

Noté aux deux passages presque chaque année (VIII; IX-29/9) (III, 8/3-IV; V) sur le Rhône et les grands étangs, souvent au confluent Ain-Rhône.

Pour le **printemps** : 1 le 23/4/1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin), 1 au passage à l'étang de Salette, le 29/3/1995 (G.Verdin), 3 le 2/4/1995, 1 sur Montmuray et 2 à la Tête, sur Frontonas (D.Loose, S.Stéfaniak, C.Deliry, K.Funkiewicz).

De **nombreuses informations sur le passage automnal**. Lors d'une journée de migration exceptionnelle, le 24/9/1994 à l'étang de Salette, **6 individus différents** passent en 1h30 (C.Deliry), suivis par un **septième en soirée** (G.Bourguelat). Un tel passage est digne des mouvements notés sur les cols de migration les plus célèbres. Pour cette même année l'espèce a été notée sur l'étang de Salette les 6/10 (C.Deliry), 13/10 (M.Bourbon) et sur le petit étang voisin le **22/10** (C.Deliry). Cette dernière date est désormais la plus **tardive** que nous possédions (record précédent 20/10/1993). Par contre il est désormais possible de mieux situer la période migratoire qui **commence exceptionnellement dès août, mais plutôt en septembre (en 1994 le 24/9) et se poursuit jusqu'au 22/10** dans la mesure où nous avons des données continues sur cette période. En effet d'autres données viennent compléter le tableau pour 1994 avec 1 oiseau le 6/10 aux étangs de la Serre (G.Verdin) et 1 autre le 16/10 aux carrières de Champdieu sur Mépieu (M.P.Schabert, E.de Thiersan, K.Funkiewicz et C.Deliry). Ce sont **12 Balbuzards au total qui ont été signalés en 1994** dont 10 sur le secteur de l'étang de Salette! En 1995 : 1 individu migrateur passe à la Paluette sur Aoste, le 27/9 (C.Deliry).

## FAUCON CRECERELLE

*Falco tinnunculus*

LrE

Espèce semi-sédentaire, aux effectifs hivernaux fluctuants. Nidificatrice, peu de données parvenues, concernant seulement une dizaine de sites. Comme dans les années 70, la présence de l'espèce est plus dense au pied du plateau que sur le plateau lui-même.

Ce qui est peu ou pas signalé, **migration d'automne** nette constatée le 24/9/1994 à l'étang de Salette, avec le passage de **10 individus** en 1h30 (C.Deliry).

## FAUCON KOBEZ

*Falco vespertinus*

LrE

LR En Grave Danger

2 observations (passage de printemps) : Ste Marie de Tortas le 31/4/1971 et sur l'étang de Vénérieu le 1/5/1994.

## FAUCON EMERILLON

*Falco columbarius*

Espèce connue en hiver, vraisemblablement sous-observée (24/12-11/2). Première crémolane le 24/12/1989, depuis diverses observations en divers sites, particulièrement régulières sur le plateau d'Anthon.

Nous pensions que cette espèce était "**sous-observée**" en hiver dans notre précédent rapport (DELIRY, 1995). Ceci se confirme par de nouveaux contacts, certes peu fréquents, avec 1 femelle ou immature le 2/1 à l'étang de la Rama (C.Deliry, K.Funkiewicz, P.Giraud, C.Grangier) et 1 autre le 20/1 au marais de Sablonnières (C.Deliry), enfin 1 mâle à l'étang de Salette le 7/2/1995 (C.Deliry). Ceci reste conforme à la fourchette de dates connue du 24/12 en 1989 au 11/2 en 1991.

## FAUCON HOBEREAU

*Falco subbuteo*

lrI

Quasi menacé

Espèce migratrice et nidificatrice (6/3; 17/4-14/10) aux mêmes périodes que les Hirondelles... Une dizaine de couples dans les années 70, aujourd'hui nous en estimons un peu plus. Les étangs de Charamel, de Salette et le marais de l'Ambossu sont 3 des sites les plus favorables.

Des informations recueillies par R.Quesada, indiquent que les oiseaux observés en période de reproduction au marais de l'Ambossu, ne s'y reproduiraient pas ou plus, mais plutôt sur le site voisin du **marais des Luippes** dans une haie de peupliers (in litt. du 22/6/1995). Présence en **période de nidification** en 1995 au Grand étang de Mépieu (R.Quesada).

**Premiers** : 4 individus le 14/4/1995 ce qui constitue une date **précoce**; plus **précoce** encore en 1996, le **28/3** à l'étang de Salette (M.Bourbon) (première date : 17/4/1989; record exceptionnel 6/3/1989).

## FAUCON PELERIN

*Falco peregrinus*

LrE

LR Vulnérable

Espèce sédentaire, nidificatrice bien suivie depuis 1967, sur un site régulier, plus irrégulièrement suivie sur un deuxième site depuis 1975 et plus récemment sur un troisième lieu de nidification. La réussite de la nidification y est capricieuse, soumise aux **dérangements**. Erratisme constaté en divers lieux.

1 **erratique** le 29/1/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin). 1 à l'étang de Salette le 2/5 (G.Verdin).



## OUTARDE CANEPETIERE

*Otis tetrax*

LrD LR Disparu

Espèce migratrice et nidificatrice qui a vraisemblablement disparu du district. Nidificatrice à Passieu (1962-71) et Leyrieu (1965-70), signalée aussi à Malville... disparue au milieu des années 70 probablement. Sur Satolas encore en 1979-80, puis plus d'informations. Une population très relictuelle subsiste dans la Plaine de l'Ain et peut-être encore en Valbonne.

**La régression de l'espèce dans la région Rhône-Alpes s'est poursuivie** : l'espèce n'a plus été signalée dans la plaine de la Valbonne et 1 seul site subsiste dans la vallée de l'Ain en 1995 (CORA -Ain). Rien ne permet plus de confirmer sa présence dans l'**Isle Crémieu** où un **constat de disparition** doit être considéré.

Cependant une observation d'une femelle a été faite sur **St Romain de Jalionas à la mi-mai 1995** dans un secteur qu'elle affectait traditionnellement dans les années 60-70 (J.Y.Valéry) (passer en statut "**rare**" au printemps).

## PERDRIX CHOUKAR

*Alectoris chukar*

LrE

1 observation (lâchers vraisemblables) : 7/4/1982.

Une unique observation confirmée de cette espèce en avril 1982 sur Siccieu (DELIRY, 1995) doit être complétée par quelques précisions. L'auteur de cette observation (C.Grangier) a obtenu la **confirmation de lâchers** de cette espèce par les chasseurs à l'époque; ceux-ci la considérant moins intéressante que la Perdrix rouge ont décidé de ne plus lâcher que cette dernière espèce.

## PERDRIX ROUGE

*Alectoris rufa*

LrE LR Insuffisamment documenté

Sédentaire, la souche sauvage vraisemblable est complétée par des lâchers. La nidification est connue. Pas de données disponibles antérieures à 1983.

**Citons** : 2 Perdrix rouges au marais de l'Epau, le 7/5/1995 (R.Quesada).

## PERDRIX GRISE

*Perdix perdix*

LrE LR Insuffisamment documenté

Espèce sédentaire, en forte régression (données très rares désormais : hiver et période de nidification). Dans les années 70, elle est donnée commune.

## CAILLE DES BLES

*Coturnix coturnix*

LrE LR Insuffisamment documenté

Espèce migratrice et nidificatrice désormais rare (12/4-30/6; après VI...). La date de départ doit être précisée. Cette espèce est une nicheuse commune dans les années 70, passée au niveau 1 lors d'une révision de l'Atlas du CORA (1980-82), une régression se faisait déjà sentir. L'espèce doit subsister sur Parmilieu, Satolas et Bourgoin.

## FAISAN DE COLCHIDE

*Phasianus colchicus*

Espèce introduite et nidificatrice. Importants lâchers en automne et peu d'observations en hiver (2 en XI, 1 en I et 1 en II).

**Se reproduit bien dans certains secteurs** selon R.Quesada, par exemple sur Creys Mepieu (marais) avec une vingtaine de couples, ou sur Sermérieu vers Olouise.

## FAISAN VENERE

*Syrnaticus reevesii*

Une observation le 16/8/1993, espèce nicheuse sur la carte de Belley-1/50000° (1976).

Des précisions intéressantes sur cette espèce notée précédemment une seule fois le 16/8/1993 à l'étang de la Bryne, sont rapportées par R.Quesada (in litt.) : des **oiseaux lâchés (une dizaine de couples) par l'ACCA de Creys-Mépieu** dans les années 1984-85 auraient subsisté jusqu'en 1987, date à laquelle nous n'avons plus de traces.

## RALE D'EAU

*Rallus aquaticus*

Sédentaire, présentant des irrégularités d'hivernage et nicheur sur une 20aine de sites. Stabilité vraisemblable par rapport aux années 60 et 70.

## MARQUETTE PONCTUEE

*Porzana porzana*

LrD LR En Grave Danger

Espèce migratrice, notée de façon très irrégulière (4 fois) en période de nidification (11/5/1969, 13/4/1975, 18/6/1978, 28/7/1985). Elle a du être beaucoup plus commune au XIX° siècle.

Observée sur un petit site par J.F.Noblet au printemps (sans dates) : **étang de Beauve à Gouvoux**, site où l'espèce a été signalée précédemment le 13/4/1975 (DELIRY, 1995). L'espèce est selon R.Quesada à **rechercher particulièrement au marais des Luippes et de l'Ambossu**. Sur ce dernier site T.Gaultier aurait contacté - avec doutes - un chanteur le 7/5/1995. Par ailleurs l'espèce est chanteuse régulière de juillet à septembre 1995, à la **Paluette** sur Aoste (C.Deliry, D.Loose, K.Funkiewiez), lieu où **elle a très vraisemblablement niché**.

**MARQUETTE POUSSIN***Porzana parva*

LrF

Espèce non certifiée sur l'Isle Crémieu qui nichait à proximité au XIX<sup>e</sup> siècle (Miribel).

**MARQUETTE DE BAILLON***Porzana pusilla*

LrE

Espèce non certifiée sur l'Isle Crémieu dont la présence irrégulière est suspectée à proximité, au XIX<sup>e</sup> siècle (Miribel).

**RALE DE GENETS***Crex crex*

LrE

LR En Grave Danger

L'espèce n'est signalée que par 2 faits de chasse de IX et X 1981. Son statut est à compléter par une meilleure compilation de la bibliographie.

**POULE D'EAU***Gallinula chloropus*

Espèce sédentaire, nidificatrice et commune sur la plupart des étangs dans les années 70 comme aujourd'hui. Présente parfois sur de petits sites.

**Nidification** en 1995 sur les Carrières de Champdieu, Mépieu (R.Quesada), les étangs de la Serre (G.Verdin) et l'étang de Charray sur Vézeronce (C.Grangier); en 1996 à l'étang de Bas, Siccieu (C.Grangier), les étangs de la Serre, l'Huert au Bouchage et vers l'Île St Benoît (G.Verdin).

**PORPHYRION BLEU***Porphyrio porphyrio*

LrE

1 observation signalée des marais de Bourgoin au XIX<sup>e</sup> siècle dans diverses références bibliographiques de l'époque.

**FOULQUE MACROULE***Fulica atra*

Espèce sédentaire aux effectifs renforcés en hiver. Le comportement hivernal et/ou migrateur se situe entre VIII et IV. L'hivernage record sur un site est de 731 le 3/1/1990 à la Vallée Bleue. Disséminée en période de nidification, elle semble plus nombreuse que dans les années 60. 1 individu tué en 11/1971 avait été bagué peu avant dans le canton de Luzerne (Suisse).

Nous noterons un cas de **capture de jeune Foulque au nid, par un Héron pourpré**, le 21/5/1995, sur l'étang de Salette (R.Quesada)!

A titre d'information **258 oiseaux comptés à l'étang de Ry** le 15/10/1995 (C.Grangier).

**GRUE CENDRÉE***Grus grus*

LrE

Espèce notée aux passages d'automne (2 observations!!; finX-déb.XI), de printemps (8; mi.III-mi.IV) et en hiver (3), avec en général de 1 à 5 individus. Records de 35 les 31/10/1983, 22/11/1991, en automne et de 32 le 20/3/1975 au printemps. L'Isle Crémieu est considéré comme le site le plus favorable de l'Isère pour la Grue Cendrée.

4 observées aux étangs de la Serre, le 9/4/1993 (G.Verdin & J.C.Daudel), celles-ci entrent dans le cadre du **passage pré-nuptial** estimé entre mi-mars et mi-avril et constituent la **neuvième observation** de l'espèce à cette époque. **Et de dix**, avec une **donnée précoce** de 12 oiseaux en formation sur Villette d'Anthon le 25/2/1995 (Y.Tuffery) (sinon les premières n'avaient pas été notées avant le 15/3). Cette année là, **un immature stationne longtemps sur l'étang de Salette**, noté un grand nombre de fois : les 9/4 (J.J.Thomas-Billot, G.Bourguelat), 10/4 (C.Deliry, K.Funkiewicz), 12 et 16/4 (Lo Parvi), 17/4 (G.Bourguelat, G.Verdin), 18, 21 et 22/4 (G.Verdin), 24 et 25/4 (C.Deliry), 28/4 (G.Poupon, J.J.Thomas-Billot, G.Bourguelat, C.Deliry), 30/4, 1/5 (Lo Parvi), 7/5 (D.Bellier) et 8/5 (Lo Parvi). Ce qui correspond à un **stationnement exceptionnellement long et tardif entre le 9/4 et le 8/5/1995**.

La **quatrième observation de l'espèce en automne** constitue un **record exceptionnel, avec 300 oiseaux** en vol en octobre 1994 observés à St Victor de Morestel par F.Quesada (précédent record 35 individus, ce qui était déjà considéré comme remarquable).

**ECHASSE BLANCHE***Himantopus himantopus*

Rare au printemps. 2 observations à Vénérieu, 6 le 26/3/1979 (proche du record de précocité dombiste du 21/3/1964) et 5 le 17/5/1979. 2 à l'étang de Gole le 5/5/1979.

**4ème observation** de l'espèce dans l'Isle Crémieu : 2 à l'étang de Gole, le 5/5/1989 (B.Françon). Les **5ème et 6ème** concernent 2 individus le 5/5/1993 et 2 autres le 15/5/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin). Toutes ces données concernent le **passage pré-nuptial (le seul connu chez nous)** dont les dates extrêmes restent le 26/3/1979 (très précoce) et le 17/5/1979, mais qui semble **concentré entre le 5 et le 17/5**.

**AVOCETTE***Recurvirostra avosetta*

LEw

Une observation de 4 individus le 23/4/1979 à Vénérieu.

**OEDICNEME CRIARD***Burhinus oedicnemus*

LrE LR Vulnérable

Espèce migratrice, notée nicheuse dans les années 60 et de façon "traditionnelle" jusque vers 1977, notamment dans la plaine de Leyrieu à Passieu. Noté encore en 1979 au marais de Charvas et 1985 sur Siccieu. Aujourd'hui, passage ou erratisme postnuptial en VII dans les plaines de Satolas, de Bourgoin et automne sur St Romain de Jalionas (dernier le 9/9), non signalé en nidification. Record de 12 en 3/1979.

Si une certaine **régression de l'espèce** jusqu'à une quasi disparition à la fin des années 70, était présumée précédemment (DELIRY, 1995), nos recherches montrent aujourd'hui que l'espèce **avait niché** sur Arandon (Corcharbin), jusqu'en 1986-87 (T.Mangenot). Par ailleurs l'Oédicnème a été noté **en période de nidification en 1994 et 1995** sur la carrière des Sambettes, sur St Romain de Jalionas, avec observations notamment les 25/6 et 2/7 en 1995 (J.J.Thomas-Billot, C.Deliry, S.Stéfaniak, D.Loose).

**GLAREOLE A COLLIER***Glareola pratincola*

LrE

1 donnée concerne 1 oiseau du 24 au 28/4/1993 aux étangs de la Serre, faisant suite à des tempêtes.

**PETIT GRAVELOT***Charadrius dubius*

LrD LR Vulnérable

Espèce migratrice et nidificatrice (8/3-fin.VIII; mi.IX; 16/10). Signalée de manière sporadique sur différents sites en nidification, le site de Sablonnières connu depuis les années 60 altéré, n'est plus occupé (vers 1980).

Nicheur possible en 1993 : avec 3 individus le 20/4 à Brangues, 4 le 21/4 à l'étang de Vénérieu et 1 le 27/4 aux étangs de la Serre (G.Verdin). A nouveau observé à Brangues le 22/3/1994, 2 individus (G.Verdin).

**Arrivée** le 12/3 en 1995 (première date le 8/3 en 1986) avec 1 individu sur la Vallée Bleue et 1 autre aux carrières de Champdieu, sur Mépieu (S.d'Herbomez, A.Provost, X.Vaillant, C.Deliry). 9 premiers notés en 1996, encore à la Vallée Bleue, le 17/3 (G.Leblais, P.Lluch et C.Deliry). Sur le site de Champdieu, l'espèce sera notée en **période de nidification**, les 5 et 13/7/1995 (J.P.Drevon).

**GRAND GRAVELOT***Charadrius hiaticula*

LrF

5 observations, dont 4 printanières (13/4; 18/5-25/5) et une tardive en automne (1/11). Record de 11 individus les 21 et 26/5/1978. L'espèce a été notée 3 fois à l'étang de Vénérieu.

**PLUVIER DORE***Pluvialis apricaria*

1 observation d'un individu le 25/2/1985 avec des Vanneaux à Ecorcheboeuf.

**PLUVIER ARGENTE***Pluvialis squatarola*

1 observation printanière le 7/5/1977 à Vénérieu.

**VANNEAU HUPPE***Vanellus vanellus*

LrD LR En Grave Danger

Espèce présente toute l'année, en forte régression, nidificatrice relictuelle, un passage est donné au printemps (29/1; 9/2-17/4; IV) et des afflux notés en hiver dès le 31/10. Pionnière en nidification dès 1966 au marais de Bessaye, 6 sites sont occupés à la fin des années 60 (plus de 40 couples), une 50 aine de couples au milieu de la décennie suivante, poursuivie d'un retrait, déjà très net au le début des années 80 (derniers observations en période favorable en 1991). La nidification reste vraisemblable au marais de Charvas et dans la plaine de Satolas. L'hivernage est désormais très faible. Le record de 500 oiseaux à Brangues le 15/3/1988 est à souligner.

1 les 17 et 20/3/1993 et 1 encore le 17/4, aux étangs de la Serre (G.Verdin). En 1994 présents sur le même site le 29/1, 2 individus (G.Verdin), **mouvements précoces** (précédent record 9/2/1993). Notons en outre un oiseau isolé le 23/3/1996 dans la plaine de Champagne (C.Grangier), qui n'est pas sans rappeler des passages autrefois plus importants sur ce site (plus de 40 le 21/3/1982, une 10aine le 3/4/1982, Lo Parvi; 66 le 6/3/1983, C.Grangier).

**Nombres remarquables -désormais-** de 20 le 20/2/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin) et 80 au Bouchage le 13/3/1996 (C.Deliry) et mi-mars 1996 vers Morestel (G.Verdin). Le groupe de **400 individus** sur l'aérodrome de Morestel du 18/3 au 23/3/1996 est quant à lui **exceptionnel** (R.Quesada); on est proche du record signalé à Brangues à la même époque, le 15/3/1988.

**BECASSEAU MAUBECHÉ***Calidris canutus*

LEw

2 observations printanières : du 8 au 10/5/1978 sur Vénérieu et le 15/5/1983 aux étangs de la Serre.

**BECASSEAU SANDERLING***Calidris alba*

1 seule observation, le 9/5/1979 à Vénérieu.

## BECASSEAU MINUTE

*Calidris minuta*

Espèce notée aux deux passages (28/7-19/9) (15/5-12/6). Toutes les données printanières proviennent de Vénérieu (aucune en automne). 3 observations automnales sont sur Ecorcheboeuf et 1 aux carrières de Champdieu. L'espèce est signalée très rare sur le Rhône, sans plus de précisions, au début du siècle.

## BECASSEAU DE TEMMINCK

*Calidris temminckii*

Cette espèce n'a toujours pas été observée dans l'Isle Crémieu. Elle est donnée régulière au passage au début du siècle sur le département!

## BECASSEAU COCORLI

*Calidris ferruginea*

2 observations sur Vénérieu concernent chaque passage : 21/5/1979 et 24/8/1979.

## BECASSEAU VARIABLE

*Calidris alpina*

LEw

Espèce notée au passage d'automne (IX; 8/9-14/10; X) et 1 fois en hiver les 21 et 22/2/1979 (étang de Vénérieu). 9 observations automnales proviennent de Vénérieu (8/9-10/10), 7 d'Ecorcheboeuf (IX-X), 1 des étangs de la Serre (14/10/1984) et 1 des Carrières de Champdieu (12/9/1988).

## COMBATTANT VARIE

*Philomachus pugnax*

LrF

Espèce notée aux deux passages (26/8-2/9; 10/10; en général sur Vénérieu) (27/2; 9/3-2/6; 4 sites). En conséquence plus disséminé au printemps. En général moins de 4 individus ensemble. Record de 15 le 13/3/1983.

18 femelles observées sur le Rhône à l'île St Benoit le 25/4/1995 constituent un **nouveau record** numérique (G. Verdin) (précédent record : 15 à Courtenay le 13/3/1983).

## BECASSINE SOURDE

*Lymnocyptes minimus*

LEw

Espèce hivernante (6/12-5/1), 3 observations en XII et 3 autres en I. La gravière d'Ecorcheboeuf concerne 3 observations et 6 autres douteuses! 1 le 1/5/1977 (date connue pour la migration de printemps).

1 tuée début décembre 1976 (E. Berthet, in litt. du 6/12/1976 adressée à J.F. Noblet). L'oiseau reste rare en hiver et cette date est **la plus précoce** que nous possédions (précédent record 16/12/1979).

Une seule donnée connue **au printemps** avec 1 individu le 1/5/1977 sur Courtenay, ce qui correspond à quelques dates connues par ailleurs dans le département. Nous y ajouterons 1 oiseau le 17/3/1996 à l'étang de Salette (G. Leblais, P. Lluch et C. Deliry).

## BECASSINE DES MARAIS

*Gallinago gallinago*

LrF

Espèce hivernante et/ou migratrice, quasi-régulière, jusqu'à 5 ensemble, (21/9; 25/10-XII; puis ...1/5), le passage printanier est le mieux connu (III-V; 27/5). Le statut complexe de cette espèce est à préciser. Record de 20 les 20/4/1969 (Lancin) et 22/3/1987 (étang de Salette). Tardive le 27/5/1976, mais pas de preuve de nidification. 2 oiseaux bagués en ex-Tchécoslovaquie repris en XI et XII, 1966. 35 observations concernent la gravière d'Ecorcheboeuf.

A classer comme **PC en automne** (omission dans DELIRY, 1995).

1 le 14/11 à l'étang de Salette (G. Bourguelat) et 1 le 18/12/1994 aux étangs de la Serre (CORA-38). 1 le 19/3/1993 aux étangs de la Serre (G. Verdin). Groupe remarquable de **11 individus** à l'étang de Salette, le 9/11/1994 (C. Deliry); les records restent de 20 individus à Lancin le 20/4/1969 et au même étang de la Salette le 22/3/1987, ici en période printanière. Une observation mi-août 1995 aux étangs de la Serre (G. Verdin), semble révéler des **mouvements postnuptiaux bien plus précoces que nous ne l'imaginions** (premières données précoces le 21/9 en 1981, sinon le 25/10/1981), mais restons prudents, il s'agit peut-être d'un cas **exceptionnel**. En tout cas l'observation d'un individu à l'étang de Salette du 17/9/1995 (G. Bourguelat), nous invite à décaler un petit peu la date d'arrivée de façon plus raisonnable, car il est vraisemblable que la donnée du 21/9/1981, ne soit pas si précoce que nous l'imaginions.

Le schéma est désormais le suivant : **exceptionnelle dès la moitié du mois d'août, de rares observations sont faites en septembre (17/9 en 1995), suivies d'observations plus régulières dès la fin octobre (25/10/1981).**



- Bécassine des marais -

## BECASSE DES BOIS

*Scolopax rusticola*

LEw LR Insuffisamment documenté

Espèce essentiellement hivernante (23/10-16/1), même lors des hivers rigoureux (par -10° en 1962). Passage automnal irrégulier, exceptionnellement abondant en 1985 du 23/11 au 1/12. Peu de données en période de nidification et aucune preuve (8 sites proposés de 1973 à 1992).

A considérer comme **PC en automne** (omission dans DELIRY, 1995). Cependant certaines années des passages sont **exceptionnellement importants**, nous l'avons déjà signalé pour 1985 du 23/11 au 1/12 (DELIRY, 1995), mais aussi en 1976 du 25/10 au 15/11 (E. Berthet, *in litt.* du 6/12/1976 adressée à J.F. Noblet).

1 contact le 17/1/1995 aux étangs de la Serre (G. Verdin) contribue à une meilleure connaissance de l'hivernage (date retenue jusqu'alors pour la fin de l'hivernage, sensiblement identique : 16/1/1977).

Nous signalions précédemment posséder **peu de données sur la nidification** de la Bécasse (DELIRY, 1995); contactée à la croûle le 18/3/1995 sur Soleymieu (J.J. Thomas-Billot).

## BARGE A QUEUE NOIRE

*Limosa limosa*

LrE

4 observations printanières (17/3-6/5), 1 sur Vénérieu et 3 aux étangs de la Serre. Record de 10 le 6/5/1991 aux étangs de la Serre.

Le passage (**uniquement printanier**) de cette espèce concerne 4 observations (DELIRY, 1995), en deux périodes groupées fin mars et début mai; dates extrêmes du 17/3/1991 au 6/5/1991. **Une donnée très tardive, en période de nidification**, d'un individu à l'étang de la Salette le 11/6/1995 est à souligner (C. Deliry).

## COURLIS CORLIEU

*Numenius phaeopus*

Espèce signalée (à tort) le 19/5/1991 sur St Baudille...

La donnée de J.J. Thomas-Billot : 2 individus le 19/5/1991 à Bramefan, St Baudille de la Tour (DELIRY, 1995) **s'avère après vérification, concerner 2 Courlis cendrés** (erreur de saisie informatique). **Le Courlis corlieu n'appartient donc pas à la liste de notre avifaune et reste à découvrir.** Notons que l'espèce est particulièrement rare en Isère.

## COURLIS CENDRE

*Numenius arquata*

LEw LR En Danger

Espèce migratrice et peut-être encore nidificatrice (III-28/11). Les passages sont mal définis (7/10-28/11) (dès le 29/1?; III...). L'espèce est non notée entre le 29/6 et le 7/10. Sa nidification a été régulièrement signalée dans les années 60 et 70, peu notée dans les années 80. Aujourd'hui ne semble plus nicher que dans la plaine de Bourgoin et de rares sites mal suivis : régression très nette. 1 cas d'observation hivernale le 15/12/1991 à la Vallée Bleue.

En **période de nidification** contacté le 18/3 sur Soleymieu à la lande Genevray (J.J. Thomas-Billot), le couple est présent et silencieux le 28/4/1995 (G. Poupon, G. Bourguelat, J.J. Thomas-Billot, C. Deliry), ce qui constitue un bon indice de nidification de cette **espèce qui se fait très rare**.

**Premier** le 10/2/1996 à Brangues (J.P. Drevon, G. Verdin), ce qui constitue une date **précoce** (1er vers le 1/3; record 29/1/1979).

## CHEVALIER ARLEQUIN

*Tringa erythropus*

Notés aux deux passages, au moins 3 fois en automne (4/9-7/10; XII) et 8 fois au printemps (11/3-9/5). Record de 4 le 25/3/1982.

L'analyse du passage de l'espèce montre un **pic assez significatif dans la première décade de mai** (4 observations sur 8 pour le printemps), le passage s'étalant entre le 11/3 et le 9/5. Ceci n'avait pas été souligné précédemment (DELIRY, 1995).

## CHEVALIER GAMBETTE

*Tringa totanus*

LrE

Noté **uniquement** au passage de printemps, chaque année (1979-82) à Vénérieu (29/3-30/5), mais aussi aux étangs de la Serre (29/3/1987, 23/4/1990, 2 observations en 6/1981). Record de 15 le 6/4/1977, sinon solitaire. En hiver sur la carte de Belley-1/50000°.

Le nom scientifique de cette espèce est de façon précise **Tringa totanus** (erroné dans DELIRY, 1995).

## CHEVALIER ABOYEUR

*Tringa nebularia*

Noté dans des localités disséminées aux deux passages (14/7, 21/8-15/9; 9/10) (19/3-29/5; 29/6). 2 records de 6 individus les 21/4/1993 et 12/9/1988.

En 1993 : 1 le 15/4 aux étangs de la-Serre et 1 à l'étang de Vénérieu le 21/4 (G. Verdin); données dans la période de migration pré-nuptiale entre le 19/3 et le 29/5. En 1995 : 1 le 2/5 à l'étang de Salette (C. Deliry, G. Verdin). 3 les 9 et 10/9 aux carrières de Champdieu (J.P. Drevon).

## CHEVALIER CULBLANC

*Tringa ochropus*

Noté aux deux passages (9/8-15/9) (24/3-6/5). Tardif les 20, 22 et 23/6/1978. En période hivernale les 4/11/1993 et 12 et 19/1/1986. Record de 8 le 15/5/1989 à l'étang de Salette. Le plus observé des Chevaliers avec le Guignette.

1 le 21/4/1993 à l'étang de Vénérieu, 1 le 27/4/1993 et 1 le 23/4/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin); données qui entrent dans le cadre de la **migration prénuptiale** du 24/3 au 6/5. 1 **précoce** le 22/3/1994 au barrage de Brégner Cordon (G.Verdin) (précédent record : 24/3/1972). Encore **plus précoce**, le 12/3/1995 aux carrières de Champdieu, sur Mépieu (X.Vaillant, S.d'Herbomez, A.Provost, C.Deliry) où un autre est noté le 23/4 (J.P.Drevon). Cette année là les observations ont été répétées au lagunage de Brangues (J.P.Drevon), avec 2 individus le 25/3 et 7 ou 8 le 26/4 (ce chiffre est proche du record numérique de 8 à l'étang de Salette signalés le 15/5/1989). 3 tardifs le 15/5/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin). **En 1996, les 4 premiers sont signalés encore plus tôt qu'en 1995** (12/3/1995), au Bouchage, **le 9/3** (G.Verdin).

En dehors des dates connues pour la **migration prénuptiale (?)**, 2 aux carrières des Sambettes sur St Romain de Jalionas le 2/7 (S.Stéfaniak, D.Loose) et 1 le 31/7/1995 (C.Deliry) (dates au printemps du 22/3/1994 au 6/5/1986, exceptionnel le 23/6/1978).

De plus 2 observations d'isolés clairement migrateurs au petit matin, les 12 et 13/8/1995 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry), c'est au début connu de la **migration automnale** (première date le 9/8/1993).

## CHEVALIER SYLVAIN

*Tringa glareola*

LrE

Noté aux deux passages, principalement au printemps (7/4-22/5) (10/8-24/8), assez souvent solitaire, mais plusieurs fois jusqu'à 4 individus. Assez souvent sur Vénérieu.

1 le 23/4/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin). 1 les 6 (G.Bourguelat) et 7/5/1995 (G.Verdin) à l'étang de Salette. Il s'agit du **passage normal de printemps** dont les dates extrêmes connues se situent entre le 7/4/1985 et le 22/5/1978.

## CHEVALIER GUIGNETTE

*Actitis hypoleucos*

LrF

LR Vulnérable

Espèce migratrice, rares données hivernales (12/1/1994), signalée aux deux passages (27/3-9/5; V) (VII; 9/9-4/11), maximum vraisemblable en VII-VIII. Nicheuse peu fréquente sur le Rhône, peu de données récentes.

2 le 21/4/1993 à l'étang de Vénérieu, 1 le 28/4/1993 et 1 le 27/4/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin); données qui entrent dans le cadre de la **migration prénuptiale** du 27/3 au 9/5.

2 ou 3 Guignettes les 9 et 10/9/1995 aux carrières de Champdieu, relèvent de la **migration postnuptiale** (la date de premier mouvement du 9/9/1993 est égalée).

**2ème donnée hivernale crémolane**, le 8/1/1996 aux Avenières sur le Rhône (E.Bouillon, C.Deliry).

## LABBE POMARIN

*Stercorarius pomarinus*

Espèce non signalée dans l'Isle Crémieu. Accidentelle, elle a été notée le 9/11/1978 à Génas, non loin de notre secteur.

## GRAND LABBE

*Stercorarius skua*

1 individu trouvé mort le 1/2/1972 sur la Tour du Pin était né en 1971 dans les Shetlands au nord de l'Ecosse!

## MOUETTE MELANOCEPHALE

*Larus melanocephalus*

LrF

Une donnée douteuse concerne un cri suspect dans un groupe important de Mouettes rieuses au confluent Ain-Rhône le 3/11/1993.

## MOUETTE PYGMEE

*Larus minutus*

LrE

Une seule observation le 17/12/1993 sur le Rhône à Villette d'Anthon. Cette espèce est donnée rare ou accidentelle sur le Rhône (sans autre précisions) au début du siècle.

## MOUETTE DE FRANKLIN

*Larus pipixicans*

Cette espèce accidentelle d'origine américaine n'a pas été observée dans l'Isle Crémieu, mais à proximité sur le Bassin de Jonage les 22 et 23/2/1982.

## MOUETTE RIEUSE

*Larus ridibundus*

Espèce notée aux deux passages (quelques unes de retour sur le Rhône en VIII; IX-X, surtout) (sensible dès I...; 15/6) et en plus petit nombre en hiver. Des attardés ont été notés 2 fois en VI (1960 et 1991), et le 25/7/1987. L'espèce est très irrégulière et rare en dehors du Rhône.

Des commentaires de C.Grangier (*in litt.* du 4/8/1995), viennent confirmer l'impression de rareté à l'intérieur de l'Isle Crémieu signalée précédemment (DELIRY, 1995).

**Date et nombre remarquable à l'intérieur : 15 le 7/5/1993** aux étangs de la Serre (G.Verdin).

**GOELAND CENDRE***Larus canus*

LrE

Espèce hivernante irrégulière (15/10; I-II), souvent des immatures, localisés sur le Rhône. L'espèce semble passer en automne dans des groupes de Mouettes rieuses. Ce sont jusqu'à 3 hivernants qui sont notés au confluent Ain-Rhône avec une certaine régularité au cœur de l'hiver 1993-94.

**GOELAND BRUN***Larus fuscus*

Nicheur occasionnel

1 seule observation d'un immature d'un an le 5/10/1993 au confluent Ain-Rhône. L'espèce a été notée dans la proche vallée de l'Ain lors de l'automne 1993 avec une régularité déconcertante.

**GOELAND ARGENTE***Larus argentatus*

1 seule observation certifiée d'un individu parmi 32 Leucophées au confluent Ain-Rhône le 6/9/1993.

**GOELAND LEUCOPHEE***Larus cachinnans*

LrD

LR En Danger

Espèce désormais sédentaire et nidificatrice, avec de nets flux en automne (IX-déb.XI; record de 131 en 30 min. le 15/9/1993, au confluent Ain-Rhône) et un renforcement des effectifs en hivernage (XI...; record : 100aine à la Vallée Bleue en 11/1993). Les données anciennes sont attribuées raisonnablement à cette espèce, régulière dès 1976 (X-V), surtout en hiver. Ensuite quelques rares données estivales (7/1984, 8/1985, 6/1991). Vraisemblablement plus fréquent en été désormais avec la nidification connue aux carrières de Champdieu (1990, 1991) et aux étangs de la Serre (1993, 1994).

Nous devons préciser la première citation de l'espèce dont la date avait été omise précédemment (DELIRY, 1995) : il s'agit d'une donnée bibliographique de CORDONNIER (1972) qui signalait quelques couples aux Avenières près d'Evieu (nidification?).

Couple présent sur les **étangs de la Serre** dès au moins le 25/3/1993, le nid est construit dès le 15/4 (G.Verdin), la **nidification de l'espèce** sur le site en **1993** avait été signalée précédemment (DELIRY, 1995). Sur ce même site, 1 couple est à nouveau présent et couve au nid, notamment le 25/4/1994 (C.Deliry, G.Verdin), 3 jeunes seront produits en mai (J.P.Drevon, G.Verdin, G.Bourguelat, C.Grangier). L'espèce est par ailleurs présente en période de nidification à l'**étang de Salette en 1995** dès le mois de mars au moins (Lo Parvi), avec plus tardivement 2 individus le 7/5 (R.Quesada) et le 7/6 au pont de **St Didier d'Aoste** (G.Verdin), où elle est peut-être nicheuse.

**GOELAND MARIN***Larus marinus*

1 immature d'un an au confluent Ain-Rhône le 14/2/1994.

**MOUETTE TRIDACTYLE***Rissa tridactyla*

Une observation douteuse sur Serrière de Briord le 4/4/1987 (Vallée Bleue?). Par ailleurs 1 immature est noté à proximité sur l'étang de St Quentin Fallavier le 12/10/1989.

**STERNE PIERREGARIN***Sterna hirundo*

Seulement 2 données : 3 sur Mèpieu le 18/6/1978 et notée le 14/5/1989 sur les étangs de la Serre. D'autres données incertaines concernent les mêmes périodes. La nidification de l'espèce était connue dans la région lyonnaise au siècle dernier (Miribel?).

Déjà signalée avec doute sur les carrières de Champdieu, sur Mèpieu, 1 individu vraisemblable, mais encore sans certitude, noté le 1/7/1995, accompagnée de 3 Guifettes noires (J.P.Drevon). **Nous n'avons pour l'instant que 2 données certaines sur l'Isle Crémieu** : le 18/6/1978, avec 3 individus sur Mèpieu et le 14/5/1989 sur les étangs de la Serre. **A ces deux données s'ajoutent un total de 4 données plus ou moins douteuses.**

**STERNE NAINE***Sterna albifrons*

LrE

Espèce non notée sur l'Isle Crémieu. Signalons qu'elle devait nicher à Miribel au XIX<sup>e</sup> siècle et se montrer alors chez nous.

**GUIFETTE MOUSTAC***Chlidonias hybridus*

LrE

Espèce migratrice au printemps (2/3-3/5; 19/6), souvent en petit groupe de 3 individus. Signalée en outre en été avec un record de 6, le 3/7/1984 et en automne le 10/9/1976. Nicheuse dans la Dombes voisine (cas connu depuis 1909), son passage est signalé au début du siècle sur le Rhône sans plus de précisions. La moitié des observations concernent l'étang de Mèpieu.

Plus rare que la Guifette noire, lors de la **migration printanière à l'étang de Salette**, elle n'a été en 1995, notée que, isolée, les 3/5, (G.Verdin), 6/5 (C.Deliry, K.Funkiewiez) et 22/5 (G.Verdin). Ces deux dernières dates sont les plus **tardives** que nous possédions, si on excepte une donnée exceptionnelle du 19/6 en 1978 et une donnée estivale le 3/7/1984.

## GUIFETTE NOIRE

*Chlidonias niger*

LrE

Espèce migratrice assez fréquente au printemps (18/4-17/6). Record de 7 le 20/4/1983. 1 seule donnée automnale (difficulté d'identification?) : le 22/9/1984.

4 le 26/4/1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin). 1 le 6/5 (G.Verdin, K.Funkiewicz, C.Deliry), et 1 les 20 (C.Deliry), 21/5 (R.Quesada, P.Giraud) et 2 le 23/5/1995 (G.Verdin) à l'étang de Salette. Soit pour cette année, **une nette période de passage avec stationnement de 1 à 2 individus du 6 au 23/5**. Notons que la fourchette de dates que nous possédons pour cette espèce est large : entre le 18/4/1971 et le 17/6/1978, avec a priori un **maximum de données en mai**. Elle est sans conteste **assez fréquente au printemps**.

**2ème crémolane pour l'automne** avec 3 individus aux carrières de Champdieu sur Mépieu le 1/7/1995 accompagnées vraisemblablement d'une Sterne Pierregarin (J.P.Drevon), ce qui témoigne d'un **retour précoce**. Cette même année, 1 certifiée, le 22/9 à la Vallée Bleue dans un groupe de 4 Guifettes (G.Verdin). Cette donnée est la **3ème pour l'automne** dans l'Isle Crémieu.

## GUIFETTE LEUCOPTERE

*Chlidonias leucopterus*

1 observation le 17/10/1993 (date cohérente). Elle est donnée accidentelle sans plus de précisions, sur le Rhône au début du siècle. Une donnée à proximité de notre district à Jonage le 10/5/1978.

**Deuxième donnée crémolane** (la première datant du 17/10/1993 aux étangs de la Serre), 1 adulte le 7/9/1994 sur ces mêmes étangs de la Serre (C.Deliry). Avec ces deux données nous avons une fourchette assez large de possibilité d'observation : du 7/9 au 17/10, dont les dates sont tout à fait cohérentes avec les informations obtenues en Suisse où la migration de l'espèce est bien suivie sur les lacs, notamment celui de Neuchâtel. Notons **par ailleurs une observation possible** d'un individu à la Vallée Bleue, parmi 4 Guifettes dont 1 noire certifiée, le 22/9/1995 (G.Verdin). L'axe du Rhône a d'ailleurs accueilli l'espèce en migration à proximité du district crémolan la même année, avec 2 immatures migrant accompagnés de 3 Guifettes noires, le 13/9 quelques jours auparavant, à **Murs et Gélignieux** (01).

## GANGA CATA

*Pterocles alchata*

LrE

1 oiseau tué en 1834 dans le Dauphiné à proximité de Lyon (c'est vraisemblablement dans le secteur).

## PIGEON BISET DOMESTIQUE

*Columba livia DOMESTIQUE*

Sédentaire, origine élevages. D'anciens pigeonniers révèlent un élevage traditionnel passé. Des bandes bigarrées sont connues sur divers bourgs de l'Isle Crémieu. Aucun individu rupestre n'a été repéré.

Pour les **sites réguliers** où cette espèce domestique est signalée, notons aussi Hières sur Amby où 10 à 15 oiseaux stationnent (C.Grangier, *in litt.* du 4/8/1995).

## PIGEON COLOMBIN

*Columba oenas*

LrD

LR En Danger

Espèce qui a été notée, migratrice, en période de nidification (III-X), presque aucune donnée récente. Cette espèce est cotée au niveau 2 dans l'Atlas des oiseaux nicheurs du CORA, nicheur certain sur 3 cartes 1/50000 (1976) et donnée partout en petit nombre au début des années 70, notamment dans les défilés rocheux. L'espèce est absente dans le pré-Atlas isérois (1984-88). L'espèce est clairement en régression, voire disparue. Record de 100 le 20/10/1962.

L'impression de **grande rareté** de cette espèce dans l'Isle Crémieu est confirmée par C.Grangier (*in litt.* du 4/8/1995). Notée le 6/7/1995 dans les gorges de la Fusa, 2 individus (C.Deliry). 2 **tardifs** (?) le 20/11/1995 sur Aoste (C.Deliry).

## PIGEON RAMIER

*Columba palumbus*

Espèce migratrice et nidificatrice (6/2-4/11), se remonte rarement au coeur de l'hiver dès XII. En progression en nidification par rapport au début des années 70 où l'espèce était donnée peu abondante. Le passage d'automne est sensible, notamment sur le confluent Ain-Rhône (9/11-21/11) (record 810 en 20 min. le 20/11). Record de 1000 le 19/3/1967, ce qui témoigne d'un passage printanier.

La **migration automnale** à la montagne de Tantanet dans le Bugey, notable (cf. chasse au col), concerne des oiseaux qui selon R.Quesada passent au-dessus de l'Isle Crémieu.

Un **important groupe hivernant** ou en fin de migration d'une cinquantaine d'individus, noté fin novembre-début décembre à la Paluette sur Aoste (C.Deliry). Nous signalions que l'espèce est supposée partie en hiver, mais que certaines années des oiseaux sont notés dès décembre.

**Premier chant** très précoce en 1996 : le 24/1 sur Siccieu (C.Grangier) (1ère date connue jusqu'alors : 6/2/1969). Par ailleurs **un couple est déjà sur le nid le 26/2/1996** à Dolomieu (C.Deliry). Faisant suite à **diverses observations hivernales** nous aurons constaté la précocité du chant de l'espèce et de son installation sur les sites de nidification, au moins ponctuellement.

- Pigeon colombin -



## TOURTERELLE TURQUE

*Streptopelia decaocto*

Espèce sédentaire et nidificatrice. L'espèce en expansion est notée à Bourgoin dès 1965 (?) ou 1967, au statut 1 dans l'Atlas du CORA (1977), en nette progression depuis (reste peu fréquente en 1985, 23 sites au moins en 1993). L'espèce se groupe en X et semble quitter divers villages en XI, jusqu'à mi I (baisse des effectifs), retour plus tôt sur les bourgs tel Crémieu.

L'hypothèse de baisse des effectifs au coeur de l'hiver ne semble pas convaincre tous les observateurs et mérite d'être examinée avec soin. C. Grangier n'adhère pas *a priori* à celle-ci; selon D. Loose, les effectifs diminueraient dans les villages au bénéfice de sites riches en nourriture. Cette diminution relative des effectifs est confirmée par J.P. Drevon et C. Deliry. Ce dernier observateur a par ailleurs observé quelques groupes plus importants à proximité de silos à grain au coeur de l'hiver, ce qui confirme l'idée émise par D. Loose. C. Grangier confirme de même et cite la présence de groupes à proximité des silos d'Annoisin, Optevoz, etc. La discussion reste ouverte... et selon certains, ne concernerait-elle plus que les "villages sans silos".

## TOURTERELLE DES BOIS

*Streptopelia turtur*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice (disséminée) (19/4; 15/5-5/9). Elle était nicheuse commune partout dans les années 70 et ce statut reste à peu près similaire aujourd'hui. Un passage d'automne est sensible (VIII-5/9).

## COUCOU - GEAI

*Clamator glandarius*

LrF

1 seule observation le 17/4/1972 en aval du confluent Ain-Rhône. Dans les années 70 plusieurs données proviennent de la Vallée de l'Ain et de la Valbonne et nous soulignerons une recrudescence des observations rhônalpines en 1993-94.

## COUCOU GRIS

*Cuculus canorus*

Espèce nidificatrice et migratrice (21/3; fin. III-déb. VII). Seule donnée plus tardive, exceptionnelle le 2/11/1993.

Premier tardif en 1993, signalé le 9/4 à Montcarra (Lo Parvi), de même en 1995, le 6/4 sur Ruy (C. Deliry); plus classique en 1996, le premier est donné sur Poleyrieu le 31/3 (M. Bourbon) (date la plus précoce le 21/3/1972).

## CHOUETTE EFFRAIE

*Tyto alba*

LrE

Espèce sédentaire et nidificatrice en divers points. 13 couples au début des années 70, une vingtaine de sites dans les années 80 et 90, une progression difficile à démontrer clairement.

Il n'est pas exclu qu'à l'instar des Buses ou des Faucons crécerelles, nous ayons des **afflux hivernaux** d'individus à certaines périodes. Que penser de l'observation le même soir (9/1/1996), en circulant en voiture, de **5 individus sur 6 kilomètres** entre Arcisse-St Chef et Charray-Vézeronce (C. Deliry).

## HIBOU PETIT DUC

*Otus scops*

LrE

LR En Danger

Espèce migratrice et vraisemblablement rare migratrice (19/3; 2/5-29/7). Difficile à détecter en raison de faibles densités (7 contacts signalés). Observations répétées sur Mépieu (1975 et 1989) et Parmilieu (1986 et 1992).

## HIBOU GRAND DUC

*Bubo bubo*

LrE

Quasi menacé

Sédentaire. Non cité dans les chroniques, semble en progression lente depuis la fin des années 80, avec 2 sites de nidification assez réguliers depuis 1990, avec des jeunes sur l'un d'eux. Des contacts récents ont été faits sur de nouveaux sites.

Rappelons que nous connaissions **deux sites assez réguliers** sur l'Isle Crémieu depuis les années 80. Nous nommerons à l'avenir ces sites pour des raisons pratiques et de discrétion : site W et site X.

Notons que c'est sur le **site X** que l'espèce a été le plus fréquemment signalée avec présence de jeunes en 1990, 1991 et 1992. Présence confirmée en 1995 sur le site X, contact faible le 4/3 (Comm. Faune de Lo Parvi), avec jeunes, 4 individus au total le 7/5/1995, dont 3 observés, l'espèce y est chanteuse le 8/10/1995, entamant la saison de nidification suivante (R. Quesada).

Sur le **site W** il est moins noté, avec une donnée supplémentaire, chanteur le 9/1/1995 (P. Giraud).

Une **augmentation des effectifs doit avoir lieu depuis un certain temps**, avec des contacts sur quelques nouveaux sites dont certains insolites comme l'enceinte même du village de Crémieu, avec 1 chanteur au petit matin du 31/1/1995 (K. Funkiewicz).

## CHOUETTE CHEVECHE

*Athene noctua*

LrE

LR Vulnérable

Espèce connue en assez petit nombre, elle a été signalée sur une 20aine de sites du plateau et de la plaine. Elle se révèle par son chant entre III et V. Semble en régression en plaine.

Présence d'un couple le 16/3/1996 à **Asnière** sur Villette d'Anthon, dans un secteur où nous avons peu d'informations sur l'espèce (Y. Tuffery).

En effet l'essentiel des données récentes se trouve concentré dans le secteur de **Creys-Mépieu et St Victor de Morestel**, sinon de rares données sur le plateau et les côteaux des Avenières.

## CHOUETTE HULOTTE

*Strix aluco*

Espèce sédentaire et nidificatrice sous-prospectée. Un sondage donne un chanteur tous les 500 m sur 8 km en bordure du plateau, de Crémieu à Hières sur Amby (1993).

## HIBOU MOYEN DUC

*Asio otus*

Espèce sédentaire et discrète, révélée souvent par le cri des jeunes à l'envol. Il est peu observé et est connu sur une 12aine de communes.

1 le 20/5/1995, au niveau du défilé de St Alban, Creys-Mépieu (R.Quesada).

## HIBOU DES MARAIS

*Asio flammeus*

LrE Nicheur occasionnel

4 données qui s'échelonnent entre le 10/12 et le 6/1 et 1 observation le 1/5/1974 à Tignieu. Cette espèce a niché de façon exceptionnelle en 1972 sur Dizimieu, aujourd'hui nicheur à proximité dans la plaine de la Valbonne.

Une **nouvelle donnée hivernale** (la 5ème) de cette espèce, sur le marais de Sablonnières, le 13/1/1995 (C.Deliry). Il s'agit de la date hivernale la plus **tardive**, l'espèce ayant été noté lors des 4 autres observations entre le 10/12 en 1982 et le 6/1 en 1983.

## ENGOULEVENT D'EUROPE

*Caprimulgus europaeus*

LrE LR Insuffisamment documenté

Espèce migratrice et nidificatrice (9/5-4/9), peu signalée dès VII. Elle occupe la partie occidentale du plateau ainsi que de façon plus sporadique le sud-est de l'Isle Crémieu. Une donnée hivernale non loin de notre district le 21/1/1982.

Ajouter aux **sites de nidification** la commune de **Dizimieu** où l'espèce chanteuse a été contactée par C.Grangier à Montlouvier le 19/7/1992 et **Poleyrieu** où l'espèce a été notée à la date assez tardive du 21/8/1995 (F.Micouloud) (record : 4/9/1987, mais peu noté après le mois de juillet).

Aux Fours à Chaux, sur Optevoz, 1 chanteur décolle aux pieds de R.Quesada le 8/6/1995. Notons sur ce site, 1 chant diurne vers 15h30, le **7/5/1995** (R.Quesada), cette date est de plus **la plus précoce** dans l'Isle Crémieu; précédent record 9/5/1987.

## MARTINET NOIR

*Apus apus*

Espèce migratrice et nidificatrice (11/4; déb. V-3/8). Ensuite migrateur net ou sporadique (dernier le 3/9).

**Premiers** le 17/4 en 1995, 1 individu à l'étang de Salette (Lo Parvi) et 4 le 24/4 (C.Deliry); il s'agit de **dates précoces** (record : 11/4/1976, mais en général pas avant début mai).

**En milieu campagnard nous noterons le nidification** de plusieurs individus au château de **Chapeau Cornu**, sur Vignieu, signalés le 20/5/1995 (R.Quesada).

Pour le **départ** en 1995, nous disposons de 2 dates, le 2/8 sur Siccieu (C.Grangier) et le 9/8 sur Aoste (C.Deliry). Nous repousserons la date de départ normal au 9/8, l'espèce étant ensuite très sporadique.

## MARTINET A VENTRE BLANC

*Apus melba*

Espèce migratrice et nidificatrice (5/4-30/8). Connue dès 1962 en nidification, 3 sites sont connus au début des années 70 et sont toujours occupés. Record de 20 le 11/4/1976. A la différence du Martinet noir, il est régulier tout le mois d'août.

**Nidification** de 2 couples dans le porche des **Grottes de la Balme**, notée le 25/6/1995 (R.Quesada, J.F.Noblet). Notons que la nidification de cette espèce est peu signalée sur la Balme, alors qu'elle devrait être assez régulière : nicheur en 1984, nicheur possible en 1988.

**En erratisme**, le 24/6/1995 à l'étang de Lempis où 5 individus sont observés (D.Loose, J.F.Noblet, S.Stéfaniak, C.Deliry).

Le **record** de 20 individus ensemble le 11/4/1976 aux étangs de la Serre, est largement battu avec l'observation de **140 oiseaux le 10/9/1994** à l'étang de Salette (J.B.Crouzier). Cette date est en outre la plus **tardive** que nous possédions (précédente date tardive le 30/8/1993).

## MARTIN PECHEUR D'EUROPE

*Alcedo atthis*

LrE LR Vulnérable

Espèce sédentaire, mais plus rare en hiver, sa nidification est mal vérifiée (indice probable seulement). L'espèce est assez fréquente chez nous, il s'agit peut-être d'un des secteurs les mieux fournis de la région Rhône-Alpes. Une dispersion automnale se fait sentir dès VIII et est sensible jusqu'en XI. La période de nidification est en conséquence notée de V à IX. Maxima de 3 individus ensemble.



- Martin-pêcheur -

## GUEPIER D'EUROPE

*Merops apiaster*

LrE Mesures de protect.

Espèce migratrice et nidificatrice (14/4, 6/5-21/9). En expansion, le premier cas de nidification est noté en 1968 (l'espèce était, notons-le, très rare ou accidentelle en Isère au XIX<sup>e</sup> et début du XX<sup>e</sup> siècle). La progression de l'espèce est depuis lors assez nette.

**Premiers** en 1993, le 6/5 à la décharge de Crevière (G.Verdin), en 1995 : **le 3/5** sur Passins (G.Verdin; **nouvelle date d'arrivée**).

Un **groupe exceptionnel de plus de 200 oiseaux** sur le haut-Rhône le 21/8/1994 (F.Micouloud). Encore un groupe de 100 noté le 27/9/1994, localité à préciser (G.Verdin); outre le nombre remarquable, il s'agit ici de notre donnée la plus **tardive**. Cependant, le Guêpier a été noté exceptionnellement, **plus tard encore** en 1995, avec 1 individu, **le 4/10** sur Sermérieu (G.Verdin).

Plutôt que peu commun, nous devrions considérer le Guêpier comme **assez commun en automne**.

Le **comptage du 20/8/1994** révèle 71 Guêpiers, souvent en mouvement, présents sur 6 sites (C.Deliry, D.Loose, S.Stéfaniak, K.Funkiewiez). Les sites de nidification sont alors le plus souvent désertés. Cette date pourra être retenue au moins provisoirement comme **début de la migration postnuptiale** que nous ne situons avec imprécision que début septembre jusqu'alors, ce qui est confirmé par l'observation exceptionnelle de F.Micouloud du 21/8, le lendemain. Sans plus de précisions signalons que des **mouvements de Guêpiers sont notés quotidiennement en août** 1995, sur les Roches à Siccieu (C.Grangier) et la Paluette à Aoste (C.Deliry).

## ROLLIER D'EUROPE

*Coracias garrulus*

LrE

2 observations (1 mal datée? qui reste à préciser) et 3 oiseaux à Morestel déb. VII en 1973.

## HUPPE FASCIEE

*Upupa epops*

LrD LR Vulnérable

Espèce migratrice et peu fréquente en nidification (21/3-21/9), bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un des secteurs les plus favorables du département. Régulière mais assez rare au début des années 70 (stable?). 11 observations en 1993 sont concentrées sur la carte de Bourgoin-1/50000<sup>e</sup>, avec nidification certaine sur 3 de 8 parties de cette carte, sinon 7 autres données sur les cartes de Montluel et la Tour du Pin. Un article de GRANGIER (1993) fait la synthèse des observations de 1980 à 1993.

**Première** signalée tardivement en 1993, le 3/4 à Torjonas (C.Grangier), de même en 1995, 1ère signalée le 3/4 aux Avenières (C.Deliry). Plus classique en 1996 avec première au bois des Tâches sur St Romain de Jalionas, le 28/3 (M.Bourbon) (date la plus précoce le 21/3/1973).

**2 données très tardives** à Soleymieu, vers Sablonnières les **7 et 11/10/1994** (C.Deliry). Nous conserverons comme date de départ le 21/9 (1983) cependant.

Notons le **comportement insolite d'une individu transportant des brins de paille** le 27/4/1995 sur Soleymieu (C.Deliry), cette espèce n'étant pas réputée pour construire son nid (?). **Nicheuse** à Passieu, sur les Sambettes, les 25/6 (C.Deliry, D.Loose, S.Stéfaniak) et le 2/7/1995 (S.Stéfaniak, D.Loose). Par ailleurs 1 chante au village de St Baudille de la Tour le 25/6/1995 (P.Giraud) et 1 aux Ravières sur Siccieu le 23/6/1996 (C.Grangier).

## TORCOL FOURMILIER

*Jynx torquilla*

LrE LR En Danger

Espèce migratrice, et vraisemblablement encore nidificatrice, quoiqu'en nette régression (IV-15/8). Régulièrement entendue dans les années 70, ce n'est de loin, plus le cas aujourd'hui.

La **nidification** récente du Torcol a été notée au Marteray (Mangenot), et R.Quesada nous invite à plus d'attention quant à sa répartition et son statut actuel, l'espèce n'a certainement pas totalement disparue en nidification (in litt. du 22/6/1995).

**Notons en effet**, 1 chanteur le 6/4 sur Ruy (C.Deliry), 1 les 12 et 22/5 à Hières sur Amby (C.Grangier), 1 le 21/5 à Charette (C.Deliry, D.Loose), 1 le 27/5 à Crémieu (C.Grangier), 1 le 29/5 à l'étang de la Salette (C.Deliry) et 1 le 25/6/1995 sur Passins (K.Funkiewiez, C.Deliry); pour 1996, 1 chanteur aux Monts d'Annoisin le 30/3, 1 dans le village de Trept le 21/5 et 1 le 28/5 à Hières sur Amby (C.Grangier). La date du **30/3/1996** est la **plus précoce** que nous possédions.

## PIC CENDRE

*Picus canus*

LrE LR En Grave Danger

Difficile à détecter en raison de faibles densités : 3 données, 16/3/1968, 25/6/1987 et 17/3/1990 (dont 2 sur Marvais sur Aoste-Granieu). Rares données en limite de district (Ile du Méant, 10/1993 et Serrière de Briord, printemps 1971).

Cette **espèce très rare** n'avait été que peu notée (3 observations jusqu'alors). Nous ajouterons une donnée d'un individu répondant par des cris et tambourinages à la repasse au **Bois de Jalionas**, le 1/3/1995 (C.Deliry). Signalons que l'espèce avait été notée sur ce même site à proximité, donné au marais du Grand Plan le 16/3/1968. Le **bois de Marvais, vers Granieu a été coupé** et il reste peu de place pour le Pic cendré qui rappelons-le y avait été observé les 25/6/1987 et 17/3/1990. Cependant à peu de kilomètres de là, 1 Pic cendré a été contacté le 17/11/1995, sur **Chimilin** (C.Deliry).

**PIC VERT***Picus viridis*

LrE

Espèce sédentaire et nidificatrice (mal suivie), régulière sur l'ensemble du district

**PIC NOIR***Dryocopus martius*

Espèce dont la lente expansion touche enfin l'Isle Crémieu avec une observation le 18/11/1993 au lac d'Hières. En outre, observé dans la plaine de l'Ain voisine le 21/1/1994.

L'année 1993 offrant la première donnée de l'espèce signalée dans l'Isle Crémieu, le 18/11 au lac d'Hières sur Amby (DELIRY, 1995), donne d'autres indices de présence avec un oiseau longuement entendu en automne sur Creys-Mépieu (G. Quesada). En 1995, l'espèce est contactée criant régulièrement sur Fézillière, à Courtenay, le 19/3 et l'espèce est recontactée le 2/10 (J.J. Thomas-Billot) : a-t-elle passé l'été (statut ? à reporter sur cette période). Le statut de l'espèce donnée comme rare en hiver, doit être complété par espèce rare en automne et au printemps. Ce sont parmi les premières citations de l'espèce dans l'Isle Crémieu.

**PIC EPEICHE***Dendrocopos major*

Sédentaire bien représenté et nicheur confirmé.

Premier tambourinage le 13/1/1996 à Siccieu (C. Grangier).

**PIC EPEICHETTE***Dendrocopos minor*

Espèce sédentaire et nidificatrice connue en période de nidification sur une vingtaine de sites et signalée sur autres sites en hivernage. Un erratisme hivernal n'est pas exclu.

**COCHEVIS HUPPE***Galerida cristata*

LrE

Une seule observation le 27/2/1988 sur Brangues.

**ALOUETTE LULU***Lullula arborea*

LrE

Quasi menacé

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice. Des mouvements semblent perceptibles aux deux passages (X) (9/2; 28/2-IV). Stable depuis les années 70, sauf peut-être dans les plaines occidentales du Rhône, où une régression est vraisemblable. Plus de 10 sites signalés. Un silence relatif du chant est noté après IV.

Premier chant le 11/2 en 1995 (C. Grangier), ce qui est assez précoce car la date du 28/2 reste retenue pour les premiers contacts classiques, bien que l'espèce ait été notée en 1989 dès le 9/2. Mieux encore en 1996, avec le premier chant noté le 14/1 sur Siccieu (C. Grangier).

Sur Siccieu, 1 couple nourrissant, alarme, le 22/4/1995 (C. Grangier). Sur Optevoz, 1 chanteur aux Fours à Chaux le 7/5/1995 (R. Quesada).

1 chanteuse automnale le 22/10/1995 sur les Ravières (C. Grangier, J.J. Thomas-Billot, J.P. Drevon, C. Deliry).

**ALOUETTE DES CHAMPS***Alauda arvensis*

LrE

Espèce présente toute l'année et nicheuse disséminée. Passage d'automne sensible, nocturnes signalés (8/10-XI). Souvent en groupe en hiver, mais en petit nombre (record : 100aine).

Passage automnal confirmé en octobre 1995 (Lo Parvi).

Premier chant le 8/3/1996 au mont d'Annoisin (C. Grangier).

**HIRONDELLE DE RIVAGE***Riparia riparia*

LrE

LR Vulnérable

Espèce migratrice et nidificatrice (25/3-17/10). Elle niche dans les Sablières où elle précède la Guépier dans de nombreux cas. Quelques colonies notables sont connues (St Didier, Champdieu, Morestel, Porcieu, Charray), 50 couples sur les berges du Rhône en 1965 (Leyrieu) et 60 en 1975 à Faverges de Mépieu. Les résultats locaux de baguage montrent des changements de colonie suivant les années, voire la même année et un passage par le Languedoc.

Les premières Hirondelles de rivage déjà notées aux étangs de la Serre le 25/3/1993 sont à attribuer à G. Verdin. Notons un groupe important d'une cinquantaine le 17/3/1995 à l'étang de Salette (C. Deliry). Outre son aspect numérique remarquable cette date est la plus précoce que nous possédions (précédente date le 25/3 en 1993).

Un passage automnal d'un autre groupe d'une cinquantaine est noté à la Paluette, le 22/9/1995 (C. Deliry).

Le comptage du 20/8/1994 révèle 89 Hirondelles de rivages, présentes sur 5 sites, avec souvent des jeunes au nid (C. Deliry, D. Loose, S. Stéfaniak, K. Funkiewiez).



## HIRONDELLE DE ROCHER

*Hirundo rupestris*

Espèce migratrice et nidificatrice (III; 12/3-IX). Nidification peu suivie, connue à Hières sur Amby depuis 1968 (lieu où l'espèce est citée sinon en 1988 et 1989). 2 nids à la Balme les Grottes le 5/9/1993. Notée en migration sur les étangs de Salette et de Mépieu.

L'arrivée en mars se précise avec l'observation précoce d'une dizaine d'individus le 2/3/1995 sur Salagnon (C. Deliry) (précédente date d'arrivée le 12/3/1989). Signalons que dans la région grenobloise l'arrivée de l'espèce est souvent signalée vers la fin du mois de février.

## HIRONDELLE DE CHEMINEE

*Hirundo rustica*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice (12/3-3/11), dont le passage d'automne est plus clairement identifié (VIII-3/11) que celui de printemps. Commune, elle est disséminée. Une donnée hivernale exceptionnelle le 15/1/1989 à la Vallée Bleue.

Y. Tuffery a suivi la **nidification** de l'espèce au hameau d'Asnière en 1995 : les premières Hirondelles y ont été notées le 22/3, les premières naissances constatées le 22/5 et l'envol de jeunes le 14/6.

En 1993 les **premières** ont été signalées tardivement le 31/3 simultanément à Dizimieu (C. Grangier), Courtenay (J. J. Thomas-Billot) et Brangues (J. P. Drevon). Parmi les premières, un groupe d'une trentaine aux carrières de Chamdiou le 19/3/1995 (R. Quesada). En 1995 l'arrivée a été d'ailleurs assez bien suivie avec 2 oiseaux le 17/3 sur l'étang de Salette et au marais de Sablonnières (C. Deliry), rares ensuite (sauf groupe signalé le 19/3), pour ne paraître plus régulières, mais encore peu nombreuses à partir de la fin du mois de mars et le début du mois d'avril (Lo Parvi). De même en 1996, les premiers grands groupes ont été notés le 2/4 sur le Rhône vers St Didier d'Aoste (C. Deliry). Son **retour est très précoce en 1996, avec 1 individu sur Brangues le 5/3** (J. P. Drevon) et 1 à l'étang de Salette le 10/3 (B. Veyron) (record précédent 12/3/1977).

En 1995, cette espèce s'est révélée particulièrement rare au mois d'octobre et les dernières notées le 15/10 (Lo Parvi). Pour le **départ** la date du 1/11/1994 est une date **assez tardive** (G. Verdin) (record : 3/11/1993).

## HIRONDELLE DE FENETRE

*Delichon urbica*

Espèce migratrice et nidificatrice (21/3; IV-14/10) connue sur diverses communes de l'Isle Crémieu. Elle quitte ses sites fin. VIII en général, mais des dortoirs et nourrissages de jeunes sont notés jusqu'à déb. X à Crémieu. Comme dans les années 70, elle est moins abondante que l'Hirondelle de cheminée.

**Nouvelle date record et précoce** avec 2 individus au plumage fatigué au confluent de l'Ain et du Rhône le 15/3/1995 (C. Deliry), ensuite l'espèce n'est notée régulièrement qu'à partir d'avril. La date d'arrivée disponible la plus précoce était le 21/3 en 1976.

## PIPIT DES ARBRES

*Anthus trivialis*

Espèce migratrice, notée au passage d'automne, solitaire en général (IX...; 28/10) (record 6 le 27/9/1993). De retour en nidification (8/4-deb. IX; 28/10), il nidifie sur les landes pentues du plateau alors que dans les années 70 il est donné dans les secteurs humides.

Sur Optevoz, 2 **nids** dont 1 avec 4 oeufs le 7/5 et 1 avec 5 oeuf les 20 et 21/5/1995, découverts aux Fours à Chaux par R. Quesada et P. Giraud.

Des **mouvements** sont constatés en **automne**, avec notamment diverses observations de migrateurs en **septembre** 1994.

**Premier précoce** en 1995, avec 1 oiseau sur Vézeronce, Mollard Coyne, le 31/3/1995 (C. Deliry) (précédente date : 8/4 en 1992).

## PIPIT FARLOUSE

*Anthus pratensis*

Nicheur occasionnel

Espèce présente en hivernage (17/10-17/4). Record de 50 le 17/3/1985.

Outre l'hivernage situé du 17/10 au 17/4, il semble que l'espèce réalise chez nous un **passage sensible en automne**, au mois d'**octobre** (en 1994 et 1995), ce qui rend pour l'heure délicate la date du début du stationnement hivernal : il s'agit peut-être de migration. L'espèce est à considérer comme au moins, **peu commune en automne**.

En tout cas l'**hivernage** est assez clair au moins **dès décembre** (1994, Lo Parvi).

Pour le **printemps**, notons 2 Farlouses migrateurs le 6/4/1995 sur Ruy, ce qui révèle en outre un **faible passage printanier** au moins.

Une donnée intéresse **un individu chanteur**, -sans suite- sur le marais de l'étang de Bas sur Siccieu le 8/5/1995 (C. Deliry). Il s'agit de loin de la date la plus tardive, nous conserverons le 17/4/1987 comme date normale de départ.

## PIPIT SPIONCELLE

*Anthus spinoletta*

Plus fréquent en hivernage que le Pipit farlouse (5/10-17/4), son passage d'automne est marqué (premiers : 5/10; passage : fin.X).

**Passage sensible en octobre** (1994, 1995) confirmé, l'**hivernage** ne se confirmera clairement que vers le mois de **décembre** en 1994 (Lo Parvi).

## BERGERONNETTE PRINTANIÈRE

*Motacilla flava*

LrD LR En Grave Danger

Très peu signalée. Notée aux deux passages (IV)(IX), celui de printemps étant un peu mieux fourni, avec 7 observations sur Ecorcheboeuf. Nidification exceptionnelle (1991) sur St Baudille.

L'impression de rareté de l'espèce sur l'Isle Crémieu est confirmée par C. Grangier, qui ne l'a jamais observée lors des 15 dernières années.

La migration en septembre annoncée précédemment (DELIRY, 1995) est confirmée par plusieurs données en 1994 (Lo Parvi). Mais encore 2 individus sont notés le 19/10/1994 à l'étang de Salette (G. Bourguelat). En 1995 plus d'attention des observateurs, permet de récolter diverses données avec 1 à la Paluette-Aoste le 11/9 (C. Deliry), 1 le 17/9 à l'étang de Salette (G. Bourguelat) et 1 à la Paluette (C. Deliry), 2 à Arandon le 19/9 (G. Bourguelat), 2 à la Paluette le 22/9 (C. Deliry) et enfin 3 sur le même site le 6/10 (C. Deliry). Il est désormais possible de donner un schéma de la période de migration postnuptiale à situer entre le 11/9 et le 6/10 au moins, avec possibilité d'observation plus tardive (cas du 19/10/1994); l'axe du Rhône à proximité du confluent du Guiers donne à la plaine au sud de St Didier d'Aoste, au niveau de la Paluette un secteur privilégié pour l'observation de l'espèce.

## BERGERONNETTE DES RUISSEAUX

*Motacilla cinerea*

Espèce sédentaire et nidificatrice, montrant des passages et/ou de l'erratisme sur le Rhône.

Un schéma général de la présence de cette espèce, éparse sur l'année, assez fréquente en bordure du Rhône, n'est pas facile à donner. Aussi nous limiterons nous à donner quelques précisions sur les localités de nidification que nous avons archivées et rapidement disponibles. L'espèce est présente en période de nidification à Hières sur Amby (1967), Optevoz (1968), Boulieu (1971 et 1972), les Avenières vers l'Île du Noyer (1990), à Brangues sur le Rhône (1983), dans le Val d'Amby sur St Baudille (1984, 1988, nicheur probable de 1993 à 1996), les Grottes de la Balme où l'espèce a niché en 1984, les Contamines sur St Chef (1989), la montée de la Tyne sur Crémieu (nicheur probable de 1992 à 1994) et la cascade des gorges de Verbois à Hières sur Amby (1994). Cependant je pense que cette liste indicatrice est loin d'être exhaustive.

## BERGERONNETTE GRISE EUROPÉENNE

*Motacilla alba alba*

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice, qui peut devenir rare en hiver. Deux passages sensibles (IX-X) (III-IV), très net en automne.

Si les mouvements automnaux peuvent se faire sentir dès septembre, il semble au vu de nombreuses observations réalisées en octobre 1994 et 1995, que ce mois concerne une période optimale pour le passage (Lo Parvi).

Certes peu nombreuses en général en hiver, il semble que des mouvements s'amorcent dès le mois de janvier, comme cela a été constaté par une nette recrudescence des observations au cours de ce mois en 1995 et en 1996 (Lo Parvi), mais un deuxième passage est très important au milieu du mois de mars en 1996 (C. Deliry).

## BERGERONNETTE DE YARELL

*Motacilla alba yarellii*

1 observation le 17/10/1993 à St Victor de Morestel et observée une fois au confluent Ain-Rhône (donnée à rechercher!).

2ème observation crémolane d'un mâle immature parmi de nombreuses Bergeronnettes grises, le 6/4/1995 à l'étang de Vénérieu (C. Deliry). 3ème observation réalisée le 17/3/1996, à la Vallée Bleue (G. Leblais et C. Deliry); 1 s'agit d'un subadulte parmi une cinquantaine de Bergeronnettes grises. La première donnée était une observation automnale le 17/10/1993 sur St Victor de Morestel.

Rare en automne, elle l'est aussi au printemps.

## JASEUR BOREAL

*Bombycilla garrulus*

3 observations concernant l'invasion de 1965-66 (XII). Une autre donnée de XII, concerne 1 individu en 1993 à Morestel.



- Jaseur boreal -

## CINCLE PLONGEUR

*Cinclus cinclus*

Espèce sédentaire, signalée en nidification dans le Val d'Amby (années 60-70) et sur le Rhône (années 70), rien depuis sur ces sites. Sinon nidification possible sur St Savin (1986) et certaine sur St Clair de la Tour (1991). En régression à cette période, le statut 2 de l'atlas du CORA semble excessif aujourd'hui. Connue en hiver sur le Guiers à Aoste, site où il pourrait nicher.

La nidification sur le Guiers, sur Aoste est confirmée récemment (1993-95) (G. Verdin).

La présence hivernale sur Aoste, déjà connue, y est par ailleurs confirmée, avec deux observations les 20/1 et 28/2/1996 (C. Deliry). L'espèce a été notée en erratisme hivernal jusqu'au pont de St Didier d'Aoste, le 6/1/1995 (C. Deliry).

Signalée dans le Val d'Amby dans les années 60, nous pensions que l'espèce devait y subsister (DELIRY, 1995), en effet, après près de 30 ans de "silence" à son sujet, 2 individus ont été observés se poursuivant le 31/5/1995 (C. Deliry).

## TROGLODYTE

*Troglodytes troglodytes*

Espèce sédentaire et nidificatrice, présente dans la plupart des milieux qui lui sont favorables. Elle chante toute l'année. En automne un erratisme ou migration est suspectée au niveau du Rhône...

## ACCENTEUR MOUCHET

*Prunella modularis*

Espèce hivernante (20/10-8/4). Notée en période de nidification sur Mépieu en 1975 (V et VII).

Première donnée très précoce en 1994, le 6/10 (C. Deliry). La date d'arrivée retenue pour l'heure reste fin octobre (30/10/1993). En 1995, le premier est signalé le 22/10 (Lo Parvi).

Encore un cas de chant pendant la période "hivernale", le 3/3/1996 sur Soleymieu (J.J. Thomas-Billot).

## ACCENTEUR ALPIN

*Prunella collaris*

Une seule observation de 3 Accenteurs alpins le 15/2/1973 à Hières sur Amby (hivernal).

## ROUGEGORGE FAMILIER

*Erithacus rubecula*

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice. Le statut 2 donné dans l'Atlas du CORA semble faible désormais (progression?). Migration automnale sensible, avec chants (déb. IX-XI). Hivernage régulier, suivi de mouvements précoces sensibles en I.

Des mouvements sensibles dès janvier énoncés précédemment (DELIRY, 1995) se sont assez clairement confirmés en 1995 (Lo Parvi), cependant une seconde vague au moins s'est fait sentir de manière significative en 1996, entre le 14/3 et le 21/3 (M. Bourbon).

## ROSSIGNOL PHILOMELE

*Luscinia megarhynchos*

Espèce migratrice et nidificatrice qui semble stable depuis les années 70 (9/4-15/8, 11/9), la période de chant est abrégée en été (13/4-9/7).

Premier à l'heure en 1993, chanteur le 13/4 à Optevoz (J.J. Thomas-Billot), par contre précoce en 1995, avec 1 chanteur sur Ruy le 6/4/1995 (C. Deliry), c'est un nouveau record; l'arrivée classique se situant vers la moitié de ce mois (date la plus précoce le 9/4/1991).

## GORGEBLEUE A MIROIR

*Luscinia svecica*

LrD LR En Grave Danger

Espèce notée au passage de printemps (29/3, 3/4-V) et nicheuse possible sur les données du mois de V avec couples cantonnés aux Avenières (1972 et 1973), cantonné à Gouvoux (13/4/1975), 3 observations aux étangs de la Serre (2/4-5/5). Dernière citation rapportée, en 1989, à l'étang Neuf sur Siccieu.

## ROUGEQUEUE NOIR

*Phoenicurus ochruros*

Espèce migratrice essentiellement et nidificatrice (10/3-X, traine d'immatures en XI). Localisé dans les années 70, il semble avoir progressé. Hivernants de temps en temps.

Date normale d'arrivée en 1993, le 12/3 à Dizimieu (C. Grangier) ce qui est proche de la date la plus précoce du 10/3/1991.

Premier chant signalé le 13/3/1996 à Poleyrieu (M. Bourbon), mais ils ne se généralisent pas avant le 23/3.

Noté de temps en temps en hiver, tel est encore le cas de cet individu contacté à Morestel, au moins du 1/12/1994 au 6/1/1995, sur le même site le 13/12/1995 et à d'autres dates, par exemple encore le 10/2/1996 (C. Deliry); l'hivernage semble avoir été bouclé sur ce site en 1995-96.

Aux Nappes, les Avenières, 1 individu le 22/2 (C. Deliry) et 1 autre le 24/2/1996 à Hières sur Amby (C. Grangier). S'agirait-il d'un retour précoce?

## ROUGEQUEUE A FRONT BLANC

*Phoenicurus phoenicurus*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice (10/3-IX; traine jusqu'au 20/10). L'espèce est commune selon le statut 3 de l'Atlas du CORA (1977), présente partout dans les années 70. Elle est peu citée récemment sans qu'il soit possible de définir une régression ou une négligence des observateurs.

Le **faible nombre de contacts sur le plateau** en particulier est souligné par C. Grangier (in litt; du 4/8/1995), ceci confirme au moins localement l'impression donnée précédemment (DELIRY, 1995).

Une information sur la **migration postnuptiale** avec 1 individu à l'étang de Salette le 22/9/1995 (G. Verdin).

## TRAQUET TARIER

*Saxicola rubetra*

Espèce qui était notée au passage de printemps (20/3-9/5, 25/5), et une fois en automne (9/8/1993). Sa nidification n'est pas prouvée et les indices anciens (1972, 1975, 1986), ne concernent que des observations de mai (peut-être au marais des Avenières?).

En début de période de nidification, 1 mâle chanteur le 7/5/1995 au promontoire Pottet sur Creys-Mépieu est signalé (R. Quesada) : a-t-on d'autres données sur ce site cette année là?

1 mâle **migrateur**, le 15/9/1995 à la Paluette sur Aoste (C. Deliry). Une fourchette de date entre le 9/8 (1983) et 15/9 (1995) peut commencer à être proposée, mais le nombre de données reste encore très faible, l'espèce est rare à cette époque de toute manière.

## TRAQUET PATRE

*Saxicola torquata*

LrE

Espèce essentiellement migratrice et fréquente en nidification (4/3-X), notamment sur le plateau. Ce statut est le même depuis les années 70. Quelques individus sont irrégulièrement notés en hiver.

Arrivée signalée tardivement en 1993, le 19/3 à l'étang de Salette (J.J. Thomas-Billot) (arrivée plus fréquemment début mars). 1er le 4/3 en 1996, sur Satolas (C. Deliry) et déjà un couple, avec mâle chanteur le 6/3/1996 aux Ravières sur Siccieu (C. Grangier).

En hiver nous signalons que quelques individus isolés restaient comme ce fut le cas au moins du 15/11 au 18/12 (Lo Parvi) à l'étang de Salette. Son départ général reste cependant à situer au mois d'octobre.

## TRAQUET MOTTEUX

*Oenanthe oenanthe*

Espèce notée aux deux passages (VIII; 30/8-19/9; X) (IV-V), plus fréquente en automne.

Nous avons peu de précision sur les limites de la période de **migration printanière**, située entre avril et mai. A ce sujet notons 1 individu sur Montcarra le 27/4 (C. Deliry), 1 autre le 10/5/1995 sur St Chef (J.J. Thomas-Billot, C. Deliry).

## MERLE A PLASTRON

*Turdus torquatus*

1 observation de 2 oiseaux le 5/4/1970 à Torjonas.

2ème donnée **crémolane**, sans date précise (mai ou juin 1995) sur Boulieu (Dr Drébers).

## MERLE NOIR

*Turdus merula*

Espèce sédentaire et nidificatrice commune. Le statut est le même dans les années 70. Les premières activités territoriales commencent en XII.

## GRIVE LITORNE

*Turdus pilaris*

Espèce hivernante irrégulière, surtout notée au début du printemps (XII-IV). En été notée les 3 et 6/8/1993. Sa nidification pourrait survenir en parallèle avec son expansion en France.

Un groupe de 170, ce qui est un record, à la Paluette sur Aoste, le 10/3/1996 (C. Deliry). Encore un groupe de 20 le 14/3/1996 (Y. Tuffery). Le **passage sensible de mars** semble confirmé.

## GRIVE MUSICIENNE

*Turdus philomelos*

Espèce migratrice et nidificatrice (28/2-X), passage de printemps sensible (fin II-V) difficile à extirper des cas nicheurs. Assez souvent en hivernage. En progression, statut 1 dans l'Atlas du CORA (1977), revue au niveau 2 (1980-82), sur 4 sites au moins en 1986, 12 chanteurs sur 5 sites du Bois de Serverin en 1990, etc., le statut 3 nous semble aujourd'hui adapté.

C. Grangier (in litt.) confirme la **présence régulière de l'espèce désormais**, ce qui renforce l'idée que le statut 1 donné dans l'atlas rhonalpin (LEBRETON, 1977) n'est plus adapté. Rappelons que nous lui accorderions carrément un statut 3 désormais (DELIRY, 1995).

Présence de Grive musicienne chanteuse dès le 20/2/1994 sur St Baudille et Charette (Lo Parvi), en 1995 le **premier chant** était noté encore plus précocement en 1995 sur Crémieu, le 21/1 (C. Deliry); la date la plus précoce proposée jusqu'alors était un 28/2.

Ce qui n'était pas encore identifié clairement, des **mouvements postnuptiaux** sont sensibles, au moins localement dans l'axe du Rhône au mois d'octobre (1995) (Lo Parvi).

## GRIVE MAUVIS

*Turdus iliacus*

Espèce hivernante sporadique (XII-27/3), présentant deux observations automnales (29/10/1984 et 17/11/1962)

A noter le 12/3/1978, observée par Parayre à l'étang de la Rama. Notée par ailleurs le 12/3 au lac de la Save, avec 4 individus et isolée le 15/3/1995 à St Chef (C.Deliry). Plus remarquable encore est ce groupement de **près de 100 Grives mauvis** au Bois Michoud, sur Salagnon, le 1/4/1995, **parmi lesquelles quelques individus chantaient** (Comm.Faune de Lo Parvi). En 1996 sur la même période l'espèce est notée le 23/3 à la lône du Sauget avec 4 individus (C.Deliry). **Flux de migration a priori** non révélé à cette période de l'année : **à préciser en mars et avril?**

Aux **données sporadiques hivernales** nous pouvons ajouter, 1 individu au niveau des Iles du Haut-Rhône le 7/1/1996 (E.Bouillon, C.Deliry) et 1 oiseau le 24/2/1996 sur Aoste (C.Deliry), peut-être migrateur précoce.

## GRIVE DRAINE

*Turdus viscivorus*

Essentiellement hivernante (alors chanteuse), quelques individus s'installent pour la nidification. Peu d'informations sur la nidification-non prouvée (de retour dès fin II), donnée au statut 1 dans l'Atlas du CORA (1977), elle semble en progression.

Premier chant signalé le 1/2/1996 sur Siccieu (C.Grangier).

## BOUSCARLE DE CETTI

*Cettia cetti*

LrD LR En Danger

Espèce fluctuante d'origine méditerranéenne, nidificatrice dans les années 60 à 1984. La première donnée remonte au 6/10/1962, puis l'espèce en progression a été notée sur 5 sites en hiver et en période de nidification (1969-84). Depuis elle a disparu en raison de la rigueur des hivers.

## CISTICOLE DES JONCS

*Cisticola juncidis*

Nicheur occasionnel

1 seule observation de cette espèce fluctuante d'origine méditerranéenne, lors de l'expansion des années 70 : le 31/8/1977 sur Frontonas.

## LOCUSTELLE TACHETEE

*Locustella naevia*

LrD LR Vulnérable

Espèce migratrice (IV-...; 23/5) et nidificatrice (chants : V-VI; dernières signalées en VIII). Connue sur les marais de Bessaye (1968) et du Grand Plan (1967 et 1968), aujourd'hui altérés, sur 6 sites dans les années 70, sur 4 signalés dans les années 80. Par contre beaucoup plus sporadique en migration (8 sites au moins). Régression vraisemblable par altération de milieux importants.

Peu d'informations disponibles sur sa date d'arrivée située en avril, nous pourrions la préciser à partir de ce chanteur du 5/4 en 1995 à l'étang de Bas sur Siccieu (K.Funkiewicz, C.Deliry).

## LOCUSTELLE LUSCINOIDE

*Locustella luscinioides*

LrD LR Vulnérable

Espèce migratrice et nidificatrice (27/3; IV-13/7...). Le départ est mal connu suite à un silence relatif dès le 17/6. Il s'agit d'un secteur remarquable de la région Rhône-Alpes pour l'espèce, commune en 1968, une quinzaine de sites ont été recensés en période de nidification depuis lors (2 sont certainement désertés car altérés). Le suivi est très partiel et un grand nombre de données concernent la période 1970-81.

## PHRAGMITE DES JONCS

*Acrocephalus schoenobaenus*

Migrateur observé au printemps (IV; 20/4-V; 1/7), sa nidification n'est pas démontrée. Peu ou pas d'observations récentes.

Il y a bien longtemps que l'espèce n'avait pas été signalée dans l'Isle Crémieu : 1 chanteur le 7/5/1995 sur l'étang de Mépieu (R.Quesada) est particulièrement remarquable, car il s'agit de la **période normale de nidification**.

## ROUSSEROLLE VERDEROLLE

*Acrocephalus palustris*

lr! Quasi menacé

Observée surtout au printemps (16/5-25/6) sa nidification n'est pas prouvée. En expansion, record 16 chanteurs en 5 points d'écoute dans le marais des Avenières, secteur privilégié pour son observation.

**Chanteuse** à la Paluette sur Aoste, le 14/6/1995 et le même jour sur la lône du Sauget (C.Deliry). Ces données répondent à d'autres informations anciennes données à St Didier le 7/6/1977 et Brangues le 16/5/1986. Sa présence ne se limite donc pas qu'au passage de printemps, mais se poursuit aussi en période de nidification de façon marginale : **statut rare** à reporter en été.

## ROUSSEROLLE EFFARVATTE

*Acrocephalus scirpaceus*

Espèce migratrice (3/4-21/8), nicheuse sur divers sites de l'Isle Crémieu.

Première tardivement signalée en 1995, le 25/4 à l'étang de Salette (C.Deliry) (date d'arrivée : 3/4/1975).

## ROUSSEROLLE TURDOIDE

*Acrocephalus arundinaceus*

LrF

Espèce migratrice (17/4-VII; IX). Nicheuse qui semble fluctuante, ses chants cesse début juillet (2/7). 2 cas exceptionnels en hiver : 23/11/1987 et 14/1/1981.

**Site à ajouter : étang de Vénérieu**, 1 entendue le 21/4/1993 (G.Verdin).

2 premiers chanteurs aux étangs de la Serre le 24/4/1993 et premier en 1994 le 26/4 (G.Verdin). **En 1995**, l'espèce aurait été contactée **très précocément** dans une haie de Villette d'Anthon, **le 2/4** (Y.Tuffery) (record : 17/4/1977), ensuite à une date plus normale le 24/4 à l'étang de Salette (C.Deliry).

Pour le **départ d'automne**, les données cessent à partir de l'arrêt du chant début juillet, nous avons par ailleurs deux données à des dates exceptionnelles des 23/11/1987 et du 14/1/1981, respectivement sur Montcarra et Optevoz. Une donnée automnale du **25/9/1994** à l'étang de Salette, permettra peut-être de mieux commencer à évaluer l'époque de son départ normal.

**Chant nocturne** noté le 24/6/1995 à l'étang de Lemps (R.Quesada, J.F.Noblet).

## HYPOLAIS POLYGLOTTE

*Hippolais polyglotta*

Espèce migratrice et nidificatrice (14/4, 4/5-24/9). Son expansion est relativement récente, avec une présence en période de nidification en 1969, notée dans diverses stations dans les années 70 et une augmentation de leur nombre dans les années 80. Au jourd'hui l'espèce est stabilisée, voire en légère régression.

## FAUVETTE A LUNETTES

*Sylvia conspicillata*

LrF

Espèce disparue signalée au début du siècle présente sur Crémieu. Cette donnée peut étonner, mais notons que l'espèce était signalée au XIX<sup>e</sup> siècle dans la Basse vallée de l'Isère, à Entremont, les Monts du Chat à Bourdeau. Aujourd'hui l'espèce s'est repliée en Ardèche. Les confusions avec la Fauvette babillarde sont exclues au vue de la connaissance correcte des 2 espèces par les auteurs.

## FAUVETTE MELANOCEPHALE

*Sylvia melanocephala*

Espèce non signalée dans l'Isle Crémieu. D'origine méditerranéenne, elle a été notée non loin de notre district, les 12 et 13/1/1974 à Bron.

## FAUVETTE ORPHEE

*Sylvia hortensis*

LrE

Espèce non observée dans l'Isle Crémieu, mais à proximité (Chassieu, nicheuse en 1970 et dans le bas Bugéy).

## FAUVETTE BABILLARDE

*Sylvia curruca*

Espèce migratrice, nidificatrice rarement signalée, l'essentiel des observations sont compatibles avec la migration de printemps (17/4-5/5) et concernent des données relativement anciennes (1968, 1975, 1977, 1978, 1989). Sur Mépieu le 18/7/1975.

Nous n'avions pas de **donnée automnale** de cette espèce; ceci est désormais le cas avec l'observation de 2 individus ensemble à l'étang de Salette **le 29/9/1994** (C.Deliry). Elle doit donc être citée comme **rare en automne**.

## FAUVETTE GRISETTE

*Sylvia communis*

Espèce migratrice et nidificatrice commune et disséminée (12/4-21/8; 12/9). Deux nichées vraisemblables, la première en VI, suivie d'une seconde possible déb. VIII.

## FAUVETTE DES JARDINS

*Sylvia borin*

Espèce migratrice et nidificatrice (28/3; 15/4-3/9), la période de chant couvre essentiellement V et VI.

**Première le 6/4/1995**, déjà sur son territoire, à Ruy (C.Deliry). Cette date pourra être retenue comme **date d'arrivée** (précédente date le 15/4; record le 28/3/1988).

## FAUVETTE A TETE NOIRE

*Sylvia atricapilla*

Espèce migratrice et nidificatrice (18/2; 2/3-X; attardés XI), le passage d'automne est perceptible (VIII-X; XI). Elle est exceptionnelle en période hivernale (II).

**Arrivée** signalée tardivement en 1993, le 16/3 à Optevoz (Lo Parvi)(date la plus précoce le 2/3/1980, record le 18/2/1990). **En 1995, la date du 11/2 concerne un nouveau record de précocité**, avec un oiseau chanteur (C.Deliry). L'arrivée est notée le 24/2 en 1996, Val d'Amby (C.Grangier) et le premier chanteur noté le 1/3 sur Aoste (C.Deliry).

Pour le **départ** situé sans précision vers le mois d'octobre, nous précisons la date du 22/10/1995 (C.Grangier).

Les **données hivernales** connues ne concernaient jusqu'alors que le mois de novembre (attardés); désormais nous possédons une donnée franchement hivernale au Ru sur Siccieu, le 7/1/1996 (C.Grangier).

## POUILLOT DE BONELLI

*Phylloscopus bonelli*

Espèce migratrice et nidificatrice peu commune (10 communes notées) (16/4-...; dernier chant : 7/7). Le statut 3 de l'Atlas du CORA est aujourd'hui exagéré et peut-être sur-estimé dès le départ.

## POUILLOT SIFFLEUR

*Phylloscopus sibilatrix*

Espèce signalée au passage de printemps (2/4-V), peut-être alors en début de période de nidification. Une seule donnée fiable dans ce sens le 5/6/1988 au bois de Serverin.

## POUILLOT VELOCE

*Phylloscopus collybita*

Espèce migratrice et nidificatrice commune (2/3-8/11). Chants essentiellement entre III et VII, timides en VIII-IX, voire X. Pas d'hivernage mis en évidence comme c'est le cas ailleurs dans la région.

En 1993 le **premier** est signalé assez tardivement le 12/3 sur Soleymieu (J.J.Thomas-Billot)(date la plus précoce le 2/3/1989). Pour 1995, le premier chanteur est signalé beaucoup plus tôt, le 1/3 (C.Deliry), d'autant plus qu'un individu qui pourrait être considéré comme **précoce** a été noté le 2/2 sur St Savin (C.Deliry). Ceci témoigne-t'il d'un cas d'hivernage qui ne nous était pas encore connu, alors que le phénomène est signalé par ailleurs dans la région ou d'une arrivée précoce? La réponse sera fournie l'hiver suivant avec 1 individu le **17/12/1995** au pont de St Didier d'Aoste (C.Deliry)(première hivernale crémolane, statut **rare** à reporter en hiver).

**Passage sensible en octobre 1994** (Lo Parvi).

## POUILLOT FITIS

*Phylloscopus trochilus*

LrD

LR En Danger

Espèce notée au passage de printemps (5/4-14/5), peu signalée en nidification, sans preuve (VI). Notée par ses cris en automne et de rares chants (dates à préciser encore). Observation très tardive le 3/12/1993 à Charvieu.

Une donnée en **période de nidification**, le 25/6/1995 vers la décharge de St Baudille (R.Quesada, J.F.Noblet).

**Passage sensible noté** en automne 1994, **au mois d'octobre** (Lo Parvi), information qui n'était pas précisée précédemment (DELIRY, 1995). 1 **attardé le 23/11/1994** à l'étang de Salette (C.Deliry); ceci n'est pas très éloigné du record considéré exceptionnel du 3/12/1993.

**Premier Fitis précoce** en 1995, 1 le 22/3 sur Leyrieu (C.Deliry); de même en 1996, au Bois des Tâches sur St Romain de Jalionas le 28/3 (M.Bourbon); le **passage sensible en nombre** est noté le 6/4 dans le secteur d'Aoste (C.Deliry)(précédente date 5/4/1981). Nous pensons que la date du 28 mars peut être retenue pour les premiers arrivants et que celle du 22 doit encore être considérée comme précoce.

## ROITELET HUPPE

*Regulus regulus*

Espèce hivernante (X-4/4), bien notée au passage d'automne (IX-X), seulement 4 données en période de nidification (2 en 1978, le 30/6/1985 et 24/5/1990)

Des **afflux d'observations furtives et répétées en septembre et octobre 1994** (Lo Parvi) semblent témoigner d'un certain **passage migratoire** à cette époque où l'espèce n'avait pas été signalée précédemment (DELIRY, 1995). Elle est à reporter comme **assez commune en automne**.

## ROITELET TRIPLE BANDEAU

*Regulus ignicapillus*

Espèce hivernante moins fréquente que le Roitelet huppé, notée au passage d'automne (IX-X), parfois au printemps. Nidification en petit nombre.

Des **afflux d'observations furtives et répétées en septembre et octobre 1994** semblent témoigner d'un certain **passage migratoire** à cette époque où l'espèce n'avait pas été signalée précédemment (DELIRY, 1995). Elle est à reporter comme **assez commune en automne**, plutôt que peu commune.

En **période de nidification** chanteur régulier sur le Bois Michoud à Salagnon (Comm. Faune de Lo Parvi).

## GOBEMOUCHE GRIS

*Muscicapa striata*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice peu commune (15/4-30/8). Ce statut est voisin de celui donné dans les années 70.

Nous suivons les remarques de R.Quesada pour considérer que l'espèce n'est **pas si rare en nidification**, aussi peut-être s'agit-il d'une **progression**. Cependant nous pensons que l'espèce discrète est peu notée. Trois preuves de nidification sont rapportées pour 1995 : nicheur probable à Trept, Montbron et à Optevoz, fours à Chaux le 20/5, nicheur certain avec jeunes nourris au nid au château de Chapeau Cornu, Vignieu les 20 et 21/5 (R.Quesada et P.Giraud) et en juin sur Brangues (J.P.Drevon).

Aussi serons nous en désaccord avec C.Grangier qui n'a jamais observé cette espèce, qu'il connaît pourtant bien, lors des 15 dernières années. J.J.Thomas-Billot précise qu'il ne l'a jamais observée sur le plateau. Nous resterons en conséquence prudents en considérant que cette question mérite d'être creusée. **En première approximation nous devons considérer que la grande rareté de l'espèce concerne tout particulièrement le plateau de Crémieu.**

## GOBEMOUCHE A COLLIER

*Ficedula albicollis*

1 observation le 11/4/1976 aux étangs de la Serre.

L'unique observation de Gobemouche à collier signalé précédemment aux étangs de la Serre le 11/4/1976 (DELIRY, 1995) est à attribuer à J.F. Noblet. Nous ajouterons une **deuxième donnée crémolane**, d'une femelle ou jeune individu, le 6/9/1994 à l'étang de la Palud (C. Deliry). L'espèce est donc à reporter comme **rare en automne**. Nous avons ainsi une donnée pour chaque passage migratoire.

## GOBEMOUCHE NOIR

*Ficedula hypoleuca*

LrD LR En Grave Danger

Noté aux deux passages (9/4-26/4), notamment en automne (16/8-10/10). De rares observations en période de nidification (VI-VII), ponctuelles dont la plus intéressante concerne un couple à Lanna le 5/6/1983, mais aucune preuve récoltée.

**Premier automnal** noté à St Romain de Jalionas, les Sambettes le 20/8/1994 (C. Deliry) ce qui est proche de la date la plus précoce du 16/8/1992. En 1995 : les premiers sont notés précocément aux Avenières, le 11/8 et sur les Iles du Rhône le 15/8 (C. Deliry) (précédente date de début du retour le 16/8/1992). De nombreux contacts de Gobemouche noir en septembre 1994 et 1995 témoignent d'une **migration assez importante** dans notre secteur (Lo Parvi). Le 8/9/1995 à la Paluette (C. Deliry).

Au **printemps une date exceptionnelle** doit être soulignée : **1 femelle le 9/3** à l'est de Morestel (C. Deliry). Celle-ci correspond à un **record de précocité notable, même à l'échelle européenne**, puisque le front de migration de l'espèce se déplace normalement lentement à l'époque au niveau de l'Afrique du nord. La date d'arrivée normale pour le passage de printemps reste le 9/4 en 1981.

## MESANGE A MOUSTACHES

*Panurus biarmicus*

1 observation le 20/4/1993, concerne deux individus aux étangs de la Serre. Notons qu'elle était signalée sur Miribel au XIX<sup>e</sup> siècle.

## MESANGE A LONGUE QUEUE

*Aegithalos caudatus*

Espèce sédentaire et nicheuse. Des mouvements semblent intervenir au passage d'automne (IX-XII).

1 couple nourrit des jeunes dans un nid constitué de lichens, accroché dans une branche d'un vieux saule, le 19/3/1995, au marais des Luippes (R. Quesada).

## MESANGE NONNETTE

*Parus palustris*

Espèce sédentaire et nidificatrice, régulière toute l'année.

## MESANGE BOREALE

*Parus montanus*

Espèce sédentaire et nidificatrice en progression. Dans les années 70, elle était donnée plutôt rare et localisée, aujourd'hui elle semble plus commune que la *Mésange nonnette*.

**Les statuts de printemps et d'été sont à monter en AC** (omission dans DELIRY, 1995).

## MESANGE HUPPEE

*Parus cristatus*

Espèce sédentaire, irrégulière en hivernage mais plus disséminée et nidificatrice en petit nombre.

Pour satisfaire la curiosité de certains, je crains que la seule citation en **période de nidification** que j'aie dans mes archives concerne la commune de Chamagnieu (1978). Cependant, l'espèce discrète si isolée est à mon avis présente à cette époque en d'autres points : aussi est-il toujours temps d'en commencer l'inventaire.

**Irrégulière en hiver** (DELIRY, 1995) : notée en octobre 1994 à Morestel (G. Verdin), le 6/1/1996 à la Paluette (C. Deliry).

## MESANGE NOIRE

*Parus ater*

Espèce sédentaire et nidificatrice en petit nombre dans les résineux. Elle est plus fréquente en hiver.

## MESANGE BLEUE

*Parus caeruleus*

Espèce sédentaire et nidificatrice commune toute l'année, parfois peu notée certains hivers.

## MESANGE CHARBONNIERE

*Parus major*

Espèce sédentaire, commune toute l'année. Chants (XII; I-VIII).

1 adulte nourrissant des jeunes dans un nichoir, sur Vernas le 25/6/1995 (R. Quesada, J.F. Noblet).

Si les **chants** peuvent commencer de façon sporadique dès le mois de décembre au moins, en 1995, nous pouvons retenir la date du 8/1 pour les premiers chants réguliers (C. Deliry).

## SITTELE TORCHEPOT

*Sitta europaea*

Espèce sédentaire et nidificatrice, moins contactée en fin d'été et d'automne. Peu notée dans les années 70, elle est plutôt commune aujourd'hui : une progression est vraisemblable.

## TICHODROME

*Tichodroma muraria*

LrF

Espèce hivernante signalée irrégulièrement (observations non assidues?) (8/10-15/12). Notée sur les falaises de la Balme les Grottes, Hières sur Amby et Leyrieu. Record de 4 à 5 individus le 7/12/1985 (Hières) et une observation printanière le 24/3/1968 (même lieu). Aucune donnée postérieure à 1988.

## GRIMPEREAU DES BOIS

*Certhia familiaris*

Signalé de façon erronée dans l'Atlas préliminaire des oiseaux nicheurs de l'Isère (1984-88).

Si l'atlas préliminaire des oiseaux nicheurs de l'Isère (1984-88) reportait de façon erronée cette espèce, le **Grimpeur des bois** entre de façon insolite dans la liste des oiseaux crémolans, avec 1 individu escaladant un mur du village de Crémieu le 25/6/1995 : erratique, égaré (D.Loose, C.Deliry, S.Stéfaniak). A reporter rare en été.

## GRIMPEREAU DES JARDINS

*Certhia brachydactyla*

Espèce sédentaire et nidificatrice commune. Ses cris se font entendre, même en hiver. Dans les années 70 l'espèce semblait avoir le même statut.

## MESANGE REMIZ

*Remiz pendulinus*

LrF

Espèce notée irrégulièrement au passage de printemps (20/3-19/4), record de 10 le 10/4/1986 aux étangs de la Serre. Un cas d'hivernage de 10/1979 à 1/1980 sur Villefontaine-Ecorcheboeuf et 2 autres données les 14/2 (Courtenay) et 4/12/1993 (étang de Ry). L'espèce est donnée très rare, accidentelle sur le Rhône, sans plus de précisions au début du siècle.

Plusieurs observées le 20/3/1993 aux **étangs de la Serre** (Lo Parvi). 1 le 13/10/1994 à l'**étang de Salette** (C.Deliry). A considérer comme **rare en automne**, car cette donnée semble relever plus de la migration que de l'hivernage. Une donnée similaire est recueillie à la **Vallée Bleue**, le 15/10/1995 avec 1 individu de passage (C.Deliry).

## LORIOT D'EUROPE

*Oriolus oriolus*

Espèce migratrice et nidificatrice (17/4, V-8/8; ...?). Assez commune notamment dans l'est du district. Les chants semblent cesser déb. VII (7/7).

**Premiers** le 21/4/1993 à l'étang de Vénérieu, assez précoce (G.Verdin) et le 27/4/1996 au bois des Tâches sur St Romain de Jalionas (C.Grangier).

## PIE GRIECHE ECORCHEUR

*Lanius collurio*

LrE

Espèce migratrice et nidificatrice (30/4-26/8) dans les landes du plateau et les haies des bocages. Dans les années 70 seulement 5 données étaient renseignées, la progression semble très significative. Deux nichées sont suspectées avec des jeunes en VI et en VIII.

## PIE GRIECHE A POITRINE ROSE

*Lanius minor*

LrE

Une donnée concerne la présence de l'espèce certifiée à Bramefan sur St Baudille les 18 et 19/5/1991.

## PIE GRIECHE GRISE

*Lanius excubitor*

LrE

LR En Grave Danger

Espèce très irrégulière, donnée en nidification et hivernage. Non citée dans l'Atlas du CORA (1977), elle est passée au statut 1 en raisons de données sur Aoste (24/6/1978 et 14/7/1982). Nidification possible en outre sur les étangs de la Serre (4/1977) et sur Satolas (1/6/1986). Un peu plus d'informations hivernales (I-II, 1966, 1968 et 1986), citée sur 2 cartes 1/50000° de l'Atlas des hivernants.

Ajouter aux rares observations **une donnée automnale** d'un individu, en novembre 1991, vers l'école du Bouchage (C.Grangier).

## PIE GRIECHE A TETE ROUSSE

*Lanius senator*

LrE

LR En Grave Danger

Espèce migratrice en régression généralisée en France (6/4, 30/4-6/6; 19/7). Aucune nidification certifiée chez nous, l'espèce a été notée dans 6 localités dont 3 fois sur le marais du Grand Plan dans les années 70. La dernière mention remonte à 1989.

## GEAI DES CHENES

*Garrulus glandarius*

Espèce sédentaire et nidificatrice, commune et largement répartie. Une dispersion automnale avec migration vraisemblable est suspectée.

## PIE BAVARDE

*Pica pica*

Espèce sédentaire et nidificatrice, bien répartie. Quelques petits dortoirs (XI-II) signalés, record 20 le 6/2/1984.

Notons **2 individus déjà sur leur nid le 20/2/1994** à St Baudille (C. Deliry).

Un dortoir signalé au confluent de l'Ain en novembre 1993 (15 à 20 oiseaux), montrait **34 individus** (c'est un record) le 15/11 en 1994 (C. Deliry). Aux dortoirs déjà signalés du confluent de l'Ain, de l'étang de Gole et de l'étang Neuf, il faut ajouter la donnée de **20 Pies aux Esserts sur Siccieu, le 27/1/1996** (C. Grangier)

## CHOCARD A BEC JAUNE

*Pyrrhocorax graculus*

Sans autres précisions l'espèce est pointée en hiver sur la carte de la Tour du Pin-1/50000° : transhumance!

## CHOUCAS DES TOURS

*Corvus monedula*

Espèce sédentaire dont les effectifs sont renforcés en hiver, le passage automnal est marqué (mi X-XI). Nidification rupestre ancienne à la Balme les Grottes (1961...) et Hières sur Amby (1968-1993), plus récemment donnée au défilé de St Alban (1992). Quelques cas de reproduction sur de vieilles batisses. Plusieurs centaines de couples rupestres, signalés dans les années 70. Dortoir mobile entre Anthon et le marais de Charvas en 1993 (quelques en IX, 100aine dès mi.X et millier en XI), qui se disperse le jour jusqu'à Crémieu et Chozeau.

Si plusieurs centaines de couples étaient signalés dans les années 70 aux falaises de Hières sur Amby (DELIRY, 1995), seules des données partielles (1982 et 1993) nous étaient ensuite parvenues. Selon C. Grangier, il y aurait une régression de l'espèce sur ce site qui semblait en première impression bien plus fréquente il y a quelques années, notamment à hauteur de Bourcieu.

## CORBEAU FREUX

*Corvus frugilegus*

Espèce nicheuse, présente toute l'année aux effectifs modifiés en hiver. En expansion vers le sud dans les années 60, avec 100 nids en 1968, plus de 500 au milieu des années 80, un millier en 1993. L'expansion continue et l'espèce a gagné St Egrève en Isère et Valence dans la Drôme. Un dortoir constitué en 1993 au confluent Ain-Rhône révèle une 50aine d'oiseaux en IX, un millier en X et plus de XI à I. Les deux passages sont marqués (X-XI) (III). Record de 25000 le 17/2/1979 et d'autres records de plusieurs milliers.

L'important dortoir signalé au confluent de l'Ain (DELIRY, 1995), est déjà connu en novembre 1973, époque où C. Grangier avait tourné un bout de film du spectacle d'environ 2000 oiseaux sur le site.

En 1993 un recensement réalisé par 5 observateurs de Lo Parvi ont localisé **10 corbeautières** pour un total de **850 nids**. Les colonies situées sur St Jean de Soudain et de Morestel représentent plus de la moitié de ce total. En 1995 des comptages ont été entrepris sur 3 sites échantillon de l'Isle Crémieu (C. Deliry), ainsi que sur St Jean de Soudain (CORA-38) : Morestel-les Rivoirettes, Passins-le Lanthey, Vénérieu-le Port. Sur l'ensemble de ces trois sites nous notions le 15/2, 352 Freux, 22 nids et 22 ébauches; le 1/3, 411 Freux, 177 nids et 45 ébauches; le 15/3, 395 nids et 39 ébauches; le 29/3, 361 nids et 2 ébauches (régression du nombre de nids, certains oiseaux pouvant construire leur site à partir des matériaux des voisins). Un comptage généralisé en Isère le 15/3/1995 (CORA-38) révèle sur l'Isle Crémieu si on excepte la colonie de St Jean de Soudain et secteur sur laquelle nous n'avons pas d'informations : **1203 Freux, 1116 nids et 71 ébauches, répartis sur 35 sites** occupés et 1 déserté; 6 anciennes stations connues n'ayant pas été occupées cette année. **De nouvelles colonies sont repérées en 1996**, dont certaines qui sont des cas de colonisation certaine : à Corbelin, le 4/3 avec 28 nids (C. Deliry).

Alors que les oiseaux locaux sont sur leurs nids, il semble que l'espèce migre encore, le 16/3 en 1996 où un groupe de 300 individus en carroussel est observé sur Aoste (C. Deliry).

## CORNEILLE NOIRE S.ST.

*Corvus corone corone*

Espèce sédentaire, répandue en nidification sur tous les secteurs (couples isolés). Des groupes sont observés dès VIII. Un dortoir est constitué sur le confluent Ain-Rhône en 1993, avec quelques individus en IX-X, mais entre 100 et 1000 en XI.

## CORNEILLE MANTELEE

*Corvus corone cornix*

Sous-espèce (pure ou hybride) réputée rare. Une migration d'automne est cependant suspectée (6/9-1/10) avec 4 données au confluent Ain-Rhône en 1993 (une autre dans la plaine de l'Ain). Notée deux fois au printemps (1/4/1991 et 30/3/1969) et une fois en hiver (8/12/1984).

1 hybride signalée en octobre 1994 sur Siccieu (C. Deliry). 1 individu pur, le 28/9/1995 sous le village de Courtenay (G. Verdin). Ceci correspond encore à la période pressentie pour une certaine migration notée du 6/9 au 1/10 pour 1993. Son statut de peu commune en automne ne semble donc pas exagéré, vu la répétition des occurrences.

2 données troublantes en période de nidification sur St Hilaire de Brens en 1995, les 22/6 (C. Deliry) et 5/7 (K. Funkiewiez). A reporter au statut rare en période estivale.

## GRAND CORBEAU

*Corvus corax*

Espèce sédentaire connue nicheuse à Hières sur Amby, régulièrement depuis 1967 (1 couple, 1967-1993; peut-être 2 en 1989 et 1990). Sa présence avait été à l'époque attribuée à une expansion de l'espèce. Nicheuse probable sur Porcieu (1991) et Vertrieu (1990). En erratisme hivernal sur Crémieu (10/11/1993) et estival sur Dizimieu, les étangs de la Serre et de Chêne. Record de 6 le 1/1/1976 à Hières sur Amby.

De nouveaux cas d'erratisme (nidification?) avec un record numérique en 1995 : **8 individus** le 8/5 en vol ascendant à Sermérieu, Collonges (R.Quesada). Le précédent record concernait 6 oiseaux à Hières sur Amby le 1/1/1978 (DELIRY, 1995). Un autre cas avec 2 oiseaux au Bois de Gillieu sur Siccieu au printemps 1995 (C.Grangier).

Pour l'hiver : 2 Grands corbeaux survolent les lles du Haute Rhône, le 1/1/1996 (S.Stéfaniak, D.Loose, C.Deliry).

## ETOURNEAU SANSONNET

*Sturnus vulgaris*

Espèce nidificatrice sédentaire commune. Des bandes et des dortoirs sont signalés à différentes périodes de l'année, mais en général de fin. VIII à l'hiver, souvent aussi en VI!

## MOINEAU DOMESTIQUE

*Passer domesticus*

Espèce sédentaire et nidificatrice commune des villages et hameaux. Un dortoir hivernal, mixte avec des Etourneaux, concernant plusieurs centaines de Moineau a été noté dans une bambuseraie de jardin à Crémieu.

## MOINEAU FRIQUET

*Passer montanus*

Espèce sédentaire et nidificatrice, non prouvée récemment. Moins régulière en nidification que le Moineau domestique, le Friquet est colonial. Il est peut-être moins commun qu'à l'époque de l'Atlas du CORA (1977).

## MOINEAU SOULCIE

*Petronia petronia*

LrD

LR Insuffisamment documenté

Espèce disparue de l'Isle Crémieu, signalée présente dans les années 50 dans l'Atlas du CORA.

## NIVEROLLE

*Montifringilla nivalis*

LrF

Une observation de 10 Niverolles le 21/1/1978 sur la Tour du Pin.

## PINSON DES ARBRES

*Fringilla coelebs*

Espèce nidificatrice, semi-sédentaire. Moins notée à la fin de l'été, les effectifs sont nettement renforcés dès déb IX par des populations vraisemblablement nordiques. Période de migration automnale à préciser (groupes d'un millier parfois). Des mouvements ont lieu du coeur de l'hiver (I) et des troupes notées jusqu'en III. Période de chant (déb II-fin VII).

Premier chant en 1995, le 15/2 (C.Deliry) et en 1996, le 25/2 (C.Deliry) (date la plus précoce le 2/2/1989).

## PINSON DU NORD

*Fringilla montifringilla*

Espèce hivernante (10/10, 26/10-déb.III), observée aux deux passages maximum en XI et II-III. Chant insolite d'un oiseau le 20/2/1990 dans un groupe d'une 50aine.

Nombre de contact très faible en novembre 1994 (Lo Parvi).

## SERIN CINI

*Serinus serinus*

Espèce essentiellement migratrice, nidificatrice (28/2, III-X), mouvements dès VIII en automne, sensibles en X. Espèce en expansion récente vers le nord de l'Europe, ce phénomène se traduit par une tendance, rare à l'hivernage (?).

En 1993 le premier est signalé assez tardivement le 12/3 à Hières sur Amby (C.Grangier), de même en 1996 : la Paluette, le 22/3 (C.Deliry) (date la plus précoce un 28/2).

Passage sensible et confirmé en octobre, en 1994 (Lo Parvi). Derniers notés le 5/11/1995 sur Anthon (Lo Parvi).

## VENTURON MONTAGNARD

*Carduelis citrinella*

Une seule observation de 2 + 1 + 2 Venturons en 20 minute, passant à Crémieu le 18/12/1983. Cette espèce n'est ni signalée en Dombes, ni sur le secteur, alors qu'en Provence, elle est transhumante (montagne de Lure par exemple).

## VERDIER D'EUROPE

*Carduelis chloris*

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice, dont les effectifs sont bien représentés en hiver par rapport à d'autres districts de plaine rhônalpins. Des groupes supérieurs à la centaine sont observés dès IX. La période de chant doit commencer en III...

## TARIN DES AULNES

*Carduelis spinus*

LrF LR Insuffisamment documenté

Espèce hivernante (25/9-31/3; 14/4), montrant un passage automnal vraisemblable (IX...). Le record à date tardive est de 38 individus le 14/4/1988.

Premiers tardivement notés en 1995 : le 31/10 (Lo Parvi).

## LINOTTE MELODIEUSE

*Acanthis cannabina*

Espèce semi-sédentaire, nidificatrice, présentant des mouvements mal connus tant aux passages qu'en hiver. Record de 80 le 26/1/1983.

## SIZERIN FLAMME

*Carduelis flammea*

LrD LR Insuffisamment documenté

7 observations essentiellement hivernales (30/10; ...14/1-16/1...) et printanières (12/3-10/4). Elles concernent souvent de petits groupes (record 40 le 14/1/1981 à Chamagnieu). La sous-espèce nordique flammea a été observée dans un groupe de 10 oiseaux à la Vallée Bleue le 16/1/1994.

## BECCROISE DES SAPINS

*Loxia curvirostra*

3 observations souvent mal précisées les 28/3/1982, 26/6/1983 et une autre en 1983. Sa nidification est possible, mais reste à vérifier...

## BOUVREUIL PIVOINE

*Pyrrhula pyrrhula*

Espèce essentiellement hivernante (17/10-30/3; 16/5). Deux indices, sans autres précisions, en période de nidification et deux dates tardives (14/4 et 16/5), pas de preuves et peu d'informations. Record de 15 le 31/1/1984.

Peu de Bouvreuils en décembre 1994 (Lo Parvi).

## GROSBEC CASSE NOYAUX

*Coccothraustes coccothraustes*

LrD LR Insuffisamment documenté

Espèce irrégulière, mieux contactée en hivernage (6/11-13/3). Notée en période de nidification (IV et VI) sur quelques sites. Record de 100 individus le 15/1/1978.

Quelques petits groupes : environ 13 individus le 20/2/1994 sur St Baudille au bois de la Femme Morte (Lo Parvi), 14 aux étangs de la Serre, le 17/12/1995 (C.Deliry). En mars 1995 plusieurs observations avec certains individus chanteurs (C.Grangier, C.Deliry).

Enfin quelques compléments pour le Grosbec en **période de nidification** avec des observations du 24/6/1995 vers l'étang de Ga, couple (C.Deliry, S.Stéfaniak, D.Loose) et l'étang de Lempis (J.F.Noblet). Rappelons que les seules données disponibles pour cette période concernent Chamagnieu (1977 à 1979) et la Tour du Pin (29/6/1975).

## BRUANT JAUNE

*Emberiza citrinella*

Espèce nidificatrice et semi-sédentaire, peu fréquente au début de l'hiver, des mouvements semblent amorcés dès janvier. Rare en nidification dans les années 70, dès le milieu des années 80 elle est donnée sur un nombre significatif de stations et elle n'est pas si rare désormais et localement plus commune que le Bruant zizi (étang Neuf, 1989). La progression est générale en période de nidification.

C'est confirmé, **l'espèce n'est aujourd'hui pas rare sur le plateau** selon C.Grangier.

## BRUANT ZIZI

*Emberiza cirius*

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice, particulièrement fréquente. Ce statut est similaire dans les années 70. Quelques petits groupes sont observés.

## BRUANT FOU

*Emberiza cia*

LrE

Signalé en hiver. Peu de données : 3 cartes 1/50000° en hivernage, 3 données datées (10/10, 7/1, 19/1) et 1 dont nous avons égaré la date qui constitue un record exceptionnel de 8 mâles et 12 femelles sur Panossas.

1 **donnée hivernale** supplémentaire : 1 sur Siccieu le 8/1/1995 (C.Grangier).

Par ailleurs une **donnée printanière**, la première qui nous parvienne, avec un couple le 12/3/1995 sur Siccieu (C.Grangier), ainsi qu'une **autre tardive**, le **25/4/1995** avec 1 mâle vers l'étang de Salette (C.Deliry). Le statut **rare** est à reporter pour le **printemps**.

## BRUANT ORTOLAN

*Emberiza hortulana*

LrE Quasi menacé

3 observations printanières, migration (28/4-7/5). En période de nidification à proximité de notre district (aéroport de Satolas, le 1/6/1989 et plaine de l'Ain).

Statut "**observé à proximité du district**" est à reporter **en été**, il est en effet présent de l'autre côté du Rhône dans la **plaine de l'Ain** (D.Genoud).

1 chanteur le 8/5/1995 aux Ravières sur Siccieu (C.Deliry), vient s'ajouter aux 3 **observations printanières** déjà connues : échelonnées entre le 28/4/1980 et cette date du 8/5/1995 (3 des observations sur les 7 et 8/5!).

## BRUANT NAIN

*Emberiza pusilla*

Espèce non signalée dans l'Isle Crémieu, mais notée à proximité sur Jonage le 22/4/1969

## BRUANT DES ROSEAUX

*Emberiza schoeniclus*

Espèce nidificatrice sur divers étangs et marais. Semi-sédentaire, discret en automne, noté peu fréquemment sur certaines zones humides au début de l'hiver, une dispersion est sensible dans les campagnes dès l (migration rampante?). Régression locale vraisemblable sur des sites importants comme le marais de Bessaye (assez nombreux en 1966).

Signalé sur **divers étangs en période de nidification** (DELIRY, 1995), il semblerait vu sa relative irrégularité sur certains sites, nécessaire d'entamer l'**inventaire de ses lieux de nidification**. Aussi citerons nous le marais de Bessaye (nicheur en 1966), grand étang de Mépieu (probable en 1989, erratique ou nicheur en 1983 et 1984), Siccieu (1983?), marais du Grand Plan (nicheur en 1966, possible en 1988), étang de Hières sur Amby (1967), étangs de la Serre (1976, 1980, 1981), marais des Avenières (1985, 1989), marais Marteret sur la Bâtie-Montgascon (nicheur en 1985), étang de la Bryne (1985, nicheur en 1987), le Sauget (1987), étang de Charamel (1986), le Rhône aux Nappes (1993), l'étang Barral vers Mépieu (1981), le marais de l'Ambossu (probable en 1981 et 1989), marais de l'Epau (1981, 1982, 1984), étang de Gole (1981, 1983, probable en 1988), étang Neuf (1982, 1983, probable en 1989), étang de Ry (1982, 1983), étang de Salette (1984 et probable en 1989), marais sur Creys (probable en 1984), étang de Bas (nicheur en 1985, possible en 1988), étang Marterin vers Mépieu (1988), marais des Luippes (1989) et de la Luve (1989) sur Creys. Nous ne pensons pas être totalement exhaustif, notamment au niveau des dates, mais ces indications devraient favoriser les recherches futures.

Pour ce qui est d'une **dispersion sensible dans les campagnes en janvier** (DELIRY, 1995) celle-ci se confirme de façon claire en 1995 (Lo Parvi).

Notons que nous avons désormais une date permettant de situer les **premiers chants** : 1 chanteur le 20/2/1995 (C. Grangier).

## BRUANT PROYER

*Miliaria calandra*

LrD LR Vulnérable

Espèce migratrice et nidificatrice localisée en général (7/3-VII). Dans les années 70 elle était en outre notée aux marais désormais altérés de Bessaye et du Grand Plan; une régression globale est depuis vraisemblable car elle n'est par ailleurs plus guère signalée dans la plaine au nord de Crémieu.



